




Содержание С. П. Копылова.





126 2A
5-64.

ТУЛЬСКИЙ ДОМАШНИЙ ЛЕЧЕБНИКЪ,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

ДЛЯ

КРЕСТЬЯНЪ И ДВОРОВЫХЪ ЛЮДЕЙ

ВЪ ДЕРЕВНЯХЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

Н. Бирфрейндомъ,

ВРАЧЕМЪ ПРИ ТУЛЬСКОЙ ГРАДСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.



МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1852.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный
Комитетъ законоенно число экземпляровъ. Москва, Ноября 10-го
1852 года.

Цензоръ, Дѣйствительный Статскій
Соупникъ и Кавалеръ И. Смирновъ.



Въ продолженіе десятилѣтняго пребыванія моего въ Туль часто случалось мнѣ замѣчать, что крестьяне и дворовые люди въ болѣзняхъ остаются безъ должнаго врачебнаго пособія. Отдаленность отъ городовъ, значительныя издержки и затрудненія посылать за врачомъ, обыкновенно служатъ тому препятствіемъ. При томъ извѣстно также, что простолюдинъ скорѣе ввѣритъ леченіе себя кому нибудь изъ своего сословія, нежели врачу.

Эти соображенія совсѣмъ не новы. Напротивъ, они подали поводъ къ довольно многочисленному роду сочиненій, извѣстныхъ подъ названіемъ до машнихъ лечебниковъ.

Не смотря на эти сочиненія, полагаю однакоже, что и предлагаемая мною книжка не будетъ излишнею. По крайней мѣрѣ въ здѣшней мѣстности между помѣщиками часто замѣчается большой недостатокъ въ практическомъ, согласномъ съ потребностью руководствѣ, по которому можно было бы узнавать и лечить обыкновенно случающіяся болѣзни. По этому многіе держатъ у себя гомеопатическіе лечебники, которые однакоже, по крайней мѣрѣ по моимъ наблюденіямъ, весьма рѣдко отвѣчаютъ своей цѣли.

Если даже и есть домашніе лечебники, отвѣчающіе своей цѣли, то слѣдуетъ представить се-

бъ и то, что Россія велика; что климать, образъ жизни и болъзни ея жителей весьма различны, и что домашній лечебникъ для двухъ или трехъ губерній, которыхъ жители находятся подъ вліяніемъ почти однихъ и тѣхъ же мѣстныхъ обстоятельствъ, отнюдь не можетъ быть излишнимъ.

При составленіи этой книжки я постоянно имѣлъ въ виду двѣ цѣли:

Во первыхъ: писать для тѣхъ, которые не имѣютъ основательныхъ познаній въ медицину. По этому я тщательно избѣгалъ всехъ ученыхъ выраженій и разсужденій. Въ намѣреніи не приводить читателя въ затрудненіе, я описывалъ только самыя нужные признаки болъзней, и предлагалъ какъ только можно меньше лекарствъ. Напротивъ, старался при всякомъ случаѣ дѣлать по возможности больше практическихъ примѣчаній и указаній, которыя хотя и могутъ иногда показаться мелочными, однако тѣмъ не меньше важныя, потому что, отъ несоблюденія ихъ, часто и самое впрочемъ правильное леченіе дѣлается бесполезнымъ.

Во вторыхъ: говорить о тѣхъ, которыхъ здорвая и сильная природа довольствуется немногими лекарствами, и въ болъшей части болъзней требуетъ скорѣе воздержанія отъ всего вреднаго, особливо отъ леченія у лекарей простолюдиновъ, нежели строгаго ученаго пользованія. Въ этой книжкѣ нѣтъ и рѣчи о новомодныхъ искусственныхъ способахъ леченія; въ ней предлагаются только средства, которыя по болъшей части из-

давно вошли въ употребленіе и вѣроятно навсегда останутся самыми употребительными, которыя легко приготовляются дома, или получаются готовыми изъ аптеки безъ рецептовъ и притомъ дешевы.

Да и для самихъ помѣщиковъ и ихъ семействъ книжка эта пригодится въ большей части случаевъ, и въ трудныхъ болѣзняхъ можетъ по крайней мѣрѣ подать первую помощь до прибытія врача.

Самое естественное народное средство, а во многихъ болѣзняхъ и самое лучшее, безспорно, холодная вода по методу Присница. Но, не говоря уже о томъ, что употребленіе этой методы требуетъ знанія дѣла, она до такой степени противится понятіямъ и обычаямъ простолюдина, что о введеніи ея нечего и говорить. Вообще остерегался я предлагать тѣ требованія, о которыхъ навѣрное зналъ, что они и не могутъ быть и не будутъ исполняемы.

Въ намѣреніи облегчить читателю употребленіе этого лечебника, я составилъ его по системѣ хотя и недостаточной; но она нѣкоторымъ образомъ излагаетъ болѣзни въ такой именно связи, въ какой представляютъ ихъ въ обыкновенной жизни. Въ книжкѣ, какова предлагаемая мною, система изложенія не составляетъ большей важности, лишь бы, по точному оглавленію, можно было легко находить подробности содержанія. Вообще неосновательно было бы судить объ этомъ сочиненіи съ ученой точки зрѣнія.

Съ цѣлію сократить объемъ этой книжки, я

умолчалъ въ ней о многихъ болѣзняхъ, которыя или рѣдко случаются, или считаются неизлечимыми у крестьянъ.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ принести искреннюю мою признательность Роману Романовичу Бейеру, Г. Аптекарю въ Туль. Безъ его опытнаго содѣйствія мнѣ трудно было бы составить этотъ лечебникъ.

Желаю, чтобы эта скромная книжка была въ рукахъ у многихъ. Думаю, что если ее будутъ правильно примѣнять къ дѣлу, то она можетъ приносить некоторую пользу, но крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ замѣнена другимъ, лучшимъ въ этомъ родѣ сочиненіемъ.

К. Бирфрейндъ.

Сентябрь 1852.

Тула.

I. ОБЩА ПРАВИЛА.

Если крестьянинъ просить пособія отъ внутренней болѣзни, то онъ не скажетъ: «У меня желу-
«дочно-желчная лихорадка,» или тому подобное; но обыкновенно скажетъ только: «У меня все бо-
леть.» Первое условіе всякаго правильнаго лече-
нія, безъ сомнѣнія, состоитъ въ томъ, чтобы
узнать, что именно лечить.

Природа и наука распредѣлили болѣзни на два обширные отдѣла: на наружныя или хирургиче-
скія и на внутреннія. Болѣзни перваго отдѣла легко узнаются по какому нибудь наружному признаку, или по ихъ причинамъ. Внутреннія болѣзни раздѣ-
лены въ этой книгѣ на три класса: на острыя, на болѣзни отъ полнокровія и на хроническія.

Изъ внутреннихъ болѣзней происходящія отъ полнокровія легко узнаются по ихъ наружнымъ явленіямъ.

Кромѣ того, есть еще женскія и дѣтскія болѣ-
зни, которыя также легко узнаются по самымъ

лицамъ, у которыхъ открываются, по наружнымъ признакамъ, или по очевиднымъ причинамъ.

И такъ, остаются только требующими ближайшаго распознаванія острия и хроническія болѣзни. (*)

Хроническія болѣзни узнаются, болѣе или менѣе, по какому нибудь очевидному наружному признаку. Вообще отличаются онѣ тѣмъ, что давно уже продолжаются и при томъ безъ лихорадки, или, по крайней мѣрѣ, сопровождаются не слишкомъ примѣтною лихорадкою. Для лучшаго распознаванія болѣзни должно изслѣдовать причины ея, образъ жизни и поведеніе больного и осмотрѣть все его тѣло.

Острыя болѣзни, всего болѣе случающіяся, отличаются въ особенности тѣмъ, что онѣ вдругъ открываются, быстро истощаютъ силы больного, потому что болѣе или менѣе сопровождаются лихорадкою (II—1) (**), и обыкновенно происходятъ отъ простуды или отъ неумѣренности въ пищѣ и питьѣ.

(*) Для врача различіе между этими классами болѣзней легко узнать вообще по пульсу, важнѣйшему изъ всѣхъ признаковъ. Но какъ этотъ признакъ требуетъ многолѣтняго изученія у кроватей больныхъ, и какъ онъ для неопытныхъ въ леченіи скорѣе будетъ сбивчивъ, нежели основательнъ, то я и счелъ за лучшее вовсе ничего не говорить о пульсѣ въ этомъ сочиненіи.

(**) Римскія цифры означаютъ отдѣленіе этой книжки, а арабскія—статью отдѣленія.

Рѣдко встрѣчаются случаи, при которыхъ трудно было бы узнавать этотъ классъ болѣзней, потому что лихорадка служитъ слишкомъ явнымъ тому признакомъ, или потому что въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ, не сопровождаемыхъ лихорадкою, на примѣръ: флюсъ, ревматизмъ, причины легко открываются, или наконецъ потому что другія болѣзни сопровождаются явными наружными признаками, на примѣръ: перемежающаяся лихорадка, поносъ и т. д.

Но часто труднѣе бываетъ различить многія этого класса болѣзни одну отъ другой, на примѣръ; простудную лихорадку отъ воспаленія въ груди, желудочно-желчную лихорадку отъ горячки. Впрочемъ, дѣло не въ названіи болѣзни. При леченіи слѣдуетъ преимущественно сообразоваться съ лихорадкою, болѣе или менѣе сильною, или съ мѣстною болью, и тогда окажется, что почти все лихорадочныя или воспалительныя болѣзни этого класса, какъ бы онѣ ни назывались, вылечиваются одними и тѣми же средствами.

Больного должно разспрашивать спокойно, тихо и съ участіемъ, и такимъ образомъ мало по малу узнаешь все, что больной отрывисто можетъ рассказать о своемъ состояніи. Одержимыхъ трудными болѣзнями слѣдуетъ разспрашивать какъ можно

короче; иначе они потеряют терпѣніе и будут давать неудовлетворительные отвѣты, повторяя слова вашихъ вопросовъ, лишь бы поскорѣе отъ васъ отдѣлаться.

а) Первый вопросъ долженъ быть о томъ, есть ли боль и гдѣ она. Если больной явственно чувствуетъ боль, то онъ тотчасъ укажетъ на нее. Какъ скоро причина и мѣсто боли наружныя, то больныя тотчасъ и узнаются. Однако же, въ болѣе части случаевъ, больной движеніемъ руки неопредѣленно показываетъ на мѣсто подъ ложкою и на грудь, и это обыкновенно служитъ признакомъ простудной, или еще чаще желудочно-желчной лихорадки.

Для того чтобъ удостовѣриться, какого рода боль, надо надавить рукою подъ ложкою, или животъ. Если при легкомъ давленіи больной вскрикнетъ, или будетъ жаловаться на боль, и если при томъ есть опухоль и сильный жаръ въ тѣлѣ, то этимъ означается внутреннее воспаленіе (II—17); если же больной выносить сильное давленіе, не смотря на то, что боль при этомъ нѣсколько увеличивается, тогда нѣтъ воспаленія.

При боли въ груди поступать такимъ же образомъ, но только еще больше обращать вниманія на дыханіе. Легкая боль въ срединѣ груди, съ сильнымъ кашлемъ, или безъ него, когда при томъ больной можетъ глубоко вздохнуть безъ

боли, означает простуду или простудную лихорадку. Если же боль въ боку, подъ ребрами, при давленіи рукою больно, и больной или вовсе не можетъ глубоко вздохнуть, или съ трудомъ, скоро и съ болью, то у него воспаленіе въ груди (II—16).

Головная боль, или круженіе головы, бываетъ во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, или отъ истощенности желудка, но сама по себѣ ничего не значитъ и проходитъ вмѣстѣ съ вышеупомянутыми болѣзнями. Но если боль усиливается такъ, что больной бредитъ, кричитъ, мечется, глаза красны, голова горяча и виски бьются, это значитъ, что начинается воспаленіе въ мозгу и требуетъ леченія по (II—10).

б) Какая причина болѣзни? При внутренней болѣзни рѣдко можно получить отвѣтъ на этотъ вопросъ, по крайней мѣрѣ не вдругъ, потому что простолоудинъ, при своемъ крѣпкомъ здоровьѣ, заботится о болѣзни тогда только, когда она давно уже продолжается и дошла до значительной степени. Обыкновенными причинами бываетъ простуда или невоздержность. Впрочемъ, должно разспросить больного о его поведеніи, родѣ занятій, о предшествовавшихъ болѣзняхъ и проч., или разузнать о томъ отъ живущихъ съ нимъ людей.

в) Не лихорадка-ли у больного? Не опредѣляя пульса, трудно въ немногихъ словахъ описать

лихорадку. Больной чувствует озноб попеременно съ жаромъ, внезапное расслабленіе и особенное нерасположеніе, которое онъ весьма правильно объясняетъ выраженіемъ: «Все болитъ.» Впрочемъ, см. (II—1).

г) Каковъ языкъ? Послѣ пульса языкъ есть важнѣйшее средство узнавать внутреннее состояніе больного, а во многихъ случаяхъ даже самое вѣрное и самое удовлетворительное. По этому не вѣлѣть больному чистить языкъ, или употреблять въ пищу что нибудь такое, отъ чего перемѣняется цвѣтъ языка, на прим: черную смородину.

Бѣловатосѣрый языкъ означаетъ много слизи и легкую простуду.

Желтый, по срединѣ темный—нечистый языкъ, при дурномъ вкусѣ и дурномъ запахѣ изо рта, означаетъ желчь въ желудкѣ, также нечистоту его и почти всегда желудочно-желчную лихорадку.

Влажный языкъ, какого бы цвѣта онъ ни былъ, показываетъ, что болѣзнь не опасна и не продолжительна.

Сухой языкъ, даже и тогда, какъ онъ не очень нечистъ, служить доказательствомъ весьма значительной болѣзни, обыкновенно внутренняго воспаленія, противъ чего должно взять мѣры.

Если языкъ болѣе и болѣе становится сухимъ

и напослѣдокъ сдѣлается черноватымъ , съ черноватою нечистотою на губахъ , то вообще мало надежды на выздоровленіе.

Какъ скоро болѣзнь утихнетъ , то и языкъ станетъ постепенно очищаться и сдѣлается влажнѣе , всегда начиная съ краевъ . Посрединѣ же онъ рѣдко очищается совершенно до тѣхъ поръ , пока у больного появится аппетитъ , и онъ начнетъ ѣсть и дѣлать движеніе.

Какъ замѣчено уже выше , должно хорошенько осматривать языкъ . При нѣкоторомъ навыкѣ , по языку можно узнавать степень болѣзни , ея усиленіе и ослабленіе , точно такъ же , какъ холодъ и теплоту по термометру.

д) Каковъ аппетитъ и есть ли жажда? нѣтъ ли тошноты и не тянетъ ли рвать?

Отсутствіемъ аппетита доказывается слизь и желчь въ желудкѣ , при лихорадкѣ , или безъ нея . Тошнота и позывъ къ рвотѣ показываютъ тоже самое , только въ высшей степени.

Жажда служитъ признакомъ внутренняго жара и лихорадки.

е) Каково на-низъ? Простолудинъ поставляетъ въ этомъ большую важность , и справедливо . Его здравый практическій разсудокъ заставляетъ считать недѣйствительными всѣ неслабительныя лекарства , и такое убѣжденіе надобно принимать въ

соображеніе. Такъ какъ большая часть внутреннихъ болѣзней его происходитъ отъ разстройства желудка, или по крайней мѣрѣ сопровождается этимъ разстройствомъ, отъ чего бываетъ запоръ; то прежде всего должно озаботиться, чтобъ было на-низъ, чѣмъ иногда вылечивается и самая болѣзнь. Сверхъ того есть старинное опытное правило, что пока желудокъ не въ порядкѣ, всякое лекарство не дѣйствуетъ такъ, какъ бы слѣдовало.

Однако-же, если болѣзнь все еще продолжается и больной ничего не ѣсть, а языкъ нѣсколько очистился, то не должно давать излишняго слабительнаго. Тогда, при запорѣ, достаточно чрезъ каждые 2 или 3 дня ставить клистирь.

ж) Напоследокъ сдѣлать больному нѣсколько вопросовъ о прежнемъ состояніи его здоровья: не пускалъ ли онъ крови, не можетъ ли сказать еще чего нибудь о своей болѣзни и проч; а у женщинъ разспросить о мѣсячномъ очищеніи; не родили ли онѣ недавно и проч.

Даже и тогда, когда болѣзнь тотчасъ распознается, на примѣръ: при переломѣ костей, должно разспросить больного; потому что во всякомъ случаѣ надобно знать, слѣдуетъ ли давать внутрь лекарства и какого именно.

На основаніи сказаннаго нами сдѣлаемъ слѣдующее примѣненіе:

Крестьянинъ 23 лѣтъ, обыкновеннаго тѣлосложенія, боленъ и проситъ помощи.

«Что у тебя болитъ?» — «Все болитъ.»

«Отъ чего ты боленъ?» — «Не знаю.»

Въ его образѣ жизни, поведеніи и наружности нѣтъ ничего, на что можно было бы обратить вниманіе.

«Не болитъ ли у тебя что нибудь?» — Онъ неопредѣленно показываетъ рукою на мѣсто подъ ложкою и на грудь. При давленіи ему рукою по названныхъ мѣсть, онъ выдерживаетъ оцущъ, но при этомъ боль подъ ложкою нѣсколько увеличивается.

«Не бросаетъ ли тебя иногда те въ ознобъ, то въ жаръ?» — «Бросаетъ.»

«Не очень ли ты слабъ силами?» — «Да, слабъ.»

«Давно ли ты боленъ?» — «Недѣли двѣ или три.»

«Покажи языкъ.» Языкъ жедтъ и нечистъ по срединѣ; влаженъ, но суже обыкновеннаго.

«Хочется ли тебѣ ѣсть?» — «Нѣтъ; вотъ уже нѣсколько дней, какъ ничего не ѣмъ.»

«Не тошно ли тебѣ и не тянетъ ли тебя рвать?» — «Бываетъ, особливо по утрамъ натошакъ.»

«Нѣтъ ли у тебя жажды и не сохнетъ ли во рту?» — «Я то и дѣло что пью.»

«Ходишь ли ты за большой нуждой?» — «Вотъ уже нѣсколько дней, какъ у меня запоръ.»

«Не можешь ли ты чегонибудь рассказать о своей болѣзни?» — «Ничего.»

Что же это за болѣзнь? Она не наружная, потому что больной тотчасъ бы показалъ ее, или сказалъ бы объ очевидной причинѣ. Дѣтской и женской болѣзни тутъ также быть не можетъ. Следовательно, болѣзнь должна быть внутренняя.

Въ числѣ внутреннихъ болѣзней ее нельзя отнести къ происходящимъ отъ полнокровія, потому что нѣтъ апоплексическаго удара и никакого кровотеченія.

Слѣдовательно это внутренняя, острая, или хроническая (долговременная) болѣзнь. Есть лихорадка, болѣзнь открылась недавно, силы быстро ослабѣваютъ; съ другой стороны, нѣтъ извѣстныхъ признаковъ, отличающихъ всякую хроническую болѣзнь, образъ жизни, поведеніе и осмотръ больного ничего не объясняютъ.

По этому, болѣзнь должна быть внутренняя, острая.

Какъ скоро узнавъ будетъ классъ болѣзни, то раскрыть книгу, сравнить признаки отдѣльно описанныхъ болѣзней съ тѣми, которые замѣчены въ больномъ, и окажется, что у него желудочно-желчная лихорадка. (*)

(*) Болѣзнь эту нарочно привожу я въ примѣръ, потому что въ числѣ 10 человекъ деревенскихъ жителей, занемогаю-

Когда найдено будетъ названіе болѣзни, то слѣдовать наставленіямъ, изложеннымъ въ описаніяхъ отдѣльно взятыхъ болѣзней и въ отдѣленіяхъ о лекарствахъ и діетѣ.

Пріемы лекарствъ разсчитаны на взрослога чело-
вѣка, мужчину или женщину. Въ дѣтскихъ бо-
лѣзняхъ пріемы разсчитаны на дѣтей. Но какъ
дѣти или молодые люди часто подвергаются
такимъ же болѣзнямъ, какъ и взрослые, то при
этомъ наблюдать слѣдующія правила:

То же самое лекарство, которое взрослый при-
нимаетъ по 1 столовой ложкѣ, отъ 8 до 15—лѣт-
няго возраста давать по 1 десертной, а дѣтямъ
отъ 8 лѣтъ до 1 года по 1 чайной ложкѣ.

Порошки, которые взрослый принимаетъ по 1
чайной ложкѣ вѣрхомъ, отъ 8 до 15 лѣтняго воз-
раста давать по 1 чайной ложкѣ вровень съ краями,
а дѣтямъ моложе 8 лѣтъ небольшее того, что мо-
жетъ помѣститься на концѣ перочиннаго ножа.

Такимъ же точно образомъ разсчитывать пріемы
и всѣхъ другихъ лекарствъ.

щихъ безъ всякихъ видимыхъ признаковъ другой болѣзни
можно съ достовѣрностью полагать 7—8 человекъ одер-
жимыхъ этою болѣзнію, съ перемежающеюся лихорадкою,
или безъ нея.

Крѣпкій, спокойный сонъ лучше всякаго лекарства. По этому никогда не должно будить больного, чтобъ дать ему лекарство. Только въ трудныхъ воспаленіяхъ, или въ лихорадкахъ, когда больной бредить, постоянно давать ему лекарство, какъ предписано. Точно такъ же и послѣ отравленія.

Если больного рветъ лекарствомъ, то давать чаще въ меньшихъ приемахъ, напримѣръ: вмѣсто 1 столовой ложки каждый часъ, по 1 десертной или чайной ложкѣ каждые полчаса.

Большая часть лекарствъ (медикаментовъ) названы въ этой книгѣ русскими именами; къ нѣкоторымъ прибавлено однако-же и латинское названіе, съ намѣреніемъ избѣгнуть недоразумѣній, потому что народныя названія нерѣдко бываютъ различны, смотря по мѣстности. Такъ, на примѣръ, въ здѣшней мѣстности укропомъ называется и *Foeniculum vulgare*, изъ сѣмень котораго готовится чай, весьма употребительный въ женскихъ и дѣтскихъ болѣзняхъ, и *Anethum graveolens*, который кладутъ въ огурцы, когда ихъ солить. И такъ, когда прибавлено латинское названіе, то всего лучше выписывать лекарство изъ аптеки подъ этимъ названіемъ.

II. БОЛѢЗНИ.

*Острыя болѣзни отъ простуды и неумѣренности
въ пищу и питье.*

Это самыя обыкновенныя причины, отъ которыхъ происходятъ кратковременныя болѣзни. Въ болѣйшей части случаевъ, для излеченія этихъ болѣзней достаточно домашнихъ средствъ, которыя, смотря по различнымъ мѣстностямъ и народнымъ обычаямъ, всякому извѣстны: отъ простуды — теплота и потогонныя средства; отъ неумѣренности въ пищу и питье — діета.

Но этого не всегда бываетъ достаточно. Весьма часто случаются такія болѣзни, для которыхъ выше названное леченіе не только недостаточно, но даже вредно.

1. **ЛИХОРАДКА** обнаруживается ознобомъ, жаромъ, недостаткомъ аппетита, жаждою, нечистымъ языкомъ, головою болью и неохотою къ движенію и обыкновеннымъ занятіямъ. Однако-же есть разнаго рода лихорадки, которыя различаются какъ своими признаками, такъ и леченіемъ.

2. **КАТАРАЛЬНАЯ** или **ОБЫКНОВЕННАЯ ПРОСТУДНАЯ ЛИХОРАДКА**. Признаки ея: насморкъ, кашель, который сначала бываетъ съ нѣкоторою

болью и сухой; озноб попеременно съ жаромъ, особливо къ вечеру; головная боль, недостатокъ аппетита, нечистый (обложенный бѣлымъ) языкъ.

Больной долженъ держать себя въ умеренной теплотѣ, не сидѣть на топленой печи, ни у двери, и почаще принимать (III—8) лекарство. Если кашель съ болью, то раза 2 или 3 въ день натирать грудь деревяннымъ масломъ и носить на ней фланель, или что нибудь шерстяное; а если при томъ сильно обложенъ языкъ и запоръ, то (III—2) и держать діету № 1-й.

Когда лихорадка утихнетъ и кашель сдѣлается легче, то значить, что болѣзнь собственно прекратилась. Мокрота станетъ отдѣляться чаще и сдѣлается гуще. Тогда должно оставить лекарство и употреблять немного сахару, меду или лакрицы, для того чтобъ облегчить отдѣленіе мокроты. Діета № 2-й.

Больной долженъ выходить тогда только, когда почувствуетъ себя совершенно здоровымъ.

3. **ФЛЮСЪ** есть опухоль щекъ съ болью, безъ зубной боли; происходитъ отъ простуды. Обыкновенно бываетъ достаточнымъ показанное (III—3) средство, и при томъ натирать опухоль 2 или 3 раза въ день (III—3), и покрывать фланелью или чѣмъ нибудь шерстянымъ. Если при томъ будетъ лихорадка, то употреблять (II—2).

4. **ЖАБА** есть воспаление зѣва (глотки), особливо такъ называемыхъ миндальныхъ железъ. Она обыкновенно происходитъ отъ простуды, преимущественно у людей золотушливыхъ.

По большей части, это болѣзнь незначительная, требующая только (III—3) и натиранія шеи (III—3), или мыломъ; при чемъ слѣдуетъ носить на шеѣ фланель или что нибудь шерстяное.

Иногда при жабѣ бываетъ сильная лихорадка, и опухоль мѣшаетъ говорить и глотать. Въ такомъ случаѣ надо поставить отъ 10 до 15 цѣвокъ къ шеѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ боль сильнѣе; потомъ употреблять натиранье (III—5). Внутрь давать (III—1 или 4), а при запорѣ (III—2). Сверхъ того полосканье изъ 1 щепоти шалфея на 2 стакана горячей воды, съ примѣсью 3—4 столовыхъ ложекъ меду. Когда боль сдѣлается легче, то въ полосканье прибавить 2 столовыя ложки уксусу.

Въ рѣдкихъ только случаяхъ — когда жаба угрожаетъ задушеніемъ — прибѣгаютъ къ кровопусканію.

У многихъ болѣзнь эта весьма легко возобновляется отъ малѣйшей простуды, или отъ употребленія острой пищи и горячительныхъ напитковъ.

Для предотвращенія этого должно каждый день, рано по утру и вечеромъ, обмывать шею холодною водою и полоскать горло, составляя полосканье изъ одной чайной ложки квасцовъ на 1 стаканъ воды.

Если же горло постоянно сжато отъ опухоли миндальныхъ железъ, то слѣдуетъ обратиться къ врачу для операціи.

У маленькихъ дѣтей (до 3 — 6 лѣтъ) всякая жаба чрезвычайно опасна. Въ сильномъ жару, когда при томъ съ большимъ напряженіемъ тянеть къ кашлю, тотчасъ поставить піявокъ къ шеѣ: годовому ребенку 1—2, ребенку до 4 лѣтъ 3—4, и повторить это на другой день, если болѣзнь не утихнетъ. Сверхъ того натирать шею политапью, раза три въ день, по половинѣ чайной ложки каждый разъ. Можно приложить къ шеѣ горчичникъ, какъ быстро помогающее средство. Относительно внутреннихъ лекарствъ, должно, какъ только можно скорѣе, обратиться къ врачу, а между тѣмъ давать (III — 4) отъ 1-й чайной до 1-й десертной ложки каждый часъ, смотря по возрасту ребенка.

3. РЕВМАТИЗМЪ происходитъ скорѣе отъ постепенной, нежели отъ быстрой простуды. Главный признакъ его боль (ломота), которая не всегда бываетъ постоянно, но иногда и прерывается, и обыкновенно къ вечеру становится сильнѣе. Боль эта часто переходитъ изъ одного мѣста въ другое. Пораженная ею часть дѣлается неподвижною.

Всякая часть тѣла можетъ подвергнуться ревматической боли.

Употреблять бани или ванны, и (III—3) и (III—5); а если онѣ не помогутъ, то поставить испанскую мушку къ больному мѣсту; при томъ одѣваться тепло и на больныхъ мѣстахъ носить фланель или другую шерстяную ткань.

Лучшее предохранительное средство отъ этой болѣзни постоянное купанье лѣтомъ въ холодной водѣ.

Нѣкоторыя части тѣла въ особенности расположены къ ревматизму.

6. ЗУБНАЯ БОЛЬ и БОЛЬ ВЪ УШАХЪ происходитъ обыкновенно отъ простуды. На одной сторонѣ болитъ нѣсколько зубовъ, или все зубы той же стороны, особливо вечеромъ; иногда боль прекращается и переходитъ въ другое мѣсто.

Употреблять показанное (II—5) средство, особливо же поставить испанскую мушку къ затылку.

Для людей полнокровныхъ, когда лицо очень красно и виски бьются, полезно прикусить нѣсколько шявокъ къ деснѣ и употреблять (III—2).

Когда одинъ или нѣсколько зубовъ испорчены, испытать тоже самое средство. При боли зубовъ отъ порчи, обыкновенно остается только выдернуть ихъ.

При боли въ ухахъ употреблять выше показанное леченіе: поставить испанскую мушку къ затылку или за ухо, и сверхъ того шпринцовать

въ самое ухо тепловатымъ деревяннымъ масломъ, или молокомъ, и держать ухо потеплѣе.

7. БОЛЬ ВЪ БЕДРѢ. Боль эта простирается отъ костреца до колѣна и даже до самой ступни. Она не такъ часто перемѣняетъ мѣсто, какъ другія ревматическія боли.

Внутреннее леченіе такое же, какъ и въ ревматизмъ (II—3). Главное средство шпанская мушка. Поставить мушку къ наружной сторонѣ ляжки не много пониже костреца; если одна не поможетъ, то другую, третью и т. д. Притомъ, если холодное время, должно обвязать ляжку чѣмъ нибудь шерстянымъ или мѣхомъ, и носить эту обвязку.

8. РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. Иногда боль въ членахъ, или другихъ частяхъ, такъ сильна, что производить лихорадку.

Больной чувствуетъ мучительную, порывистую боль; ознобъ бываетъ попеременно съ жаромъ; дѣлается расположеніе къ поту, который тотчасъ же и облегчаетъ; жажда, отсутствіе аппетита и нечистый языкъ.

Леченіе такое же, какъ и (II—2). Притомъ шпанская мушка къ больному мѣсту и натиранье (III—3). Діета № 1-й.

Лихорадка бываетъ иногда такъ сильна, что обращается въ горячку.

Въ особенности опасно, когда больной мечется отъ

безпокойства и бредить, а тѣло въ самомъ сильномъ жару безъ испарины.

Давать (III—4) и пустить три чашки крови. Если не будетъ легче, то черезъ сутки повторить кровоупусканіе. Сверхъ того, когда лицо очень красно, въ головѣ жаръ и виски сильно бьются, приклады- вать къ головѣ примочки изъ холодной воды съ уксуомъ, и поставить испанскую мушку къ затылку, а къ икрамъ горчичники. Если языкъ очень не- чистъ, то употреблять (III—2).

Больной не долженъ ничего ѣсть, да ему и не хочется; но давать пить, чѣмъ больше, тѣмъ лучше.

9. ЖЕЛУДОЧНО-ЖЕЛЧНАЯ ЛИХОРАДКА про- исходитъ больше отъ простуды, особливо весною, чѣмъ отъ неумѣренности въ пищѣ и питьѣ, хотя по- слѣдняя весьма часто служить также существенною причиною этой болѣзни. Лихорадка эта, изъ всѣхъ прочихъ, въ деревняхъ случается всего чаще. Ма- сляница, Великій Постъ и потомъ невоздержность на Святой Недѣль, разливъ рѣкъ, огорченіе, особ- ливо гнѣвъ и т. п. чрезвычайно располагають къ этой болѣзни.

Нечистый, желтый или темный языкъ, недо- статокъ аппетита, жажда, особливо на кислое питье, головная боль, или пустота головы, горькій вкусъ во рту, или отсутствіе всякаго вкуса, тошнота съ

сильнымъ позывомъ къ рвотѣ, боль при давлении подѣ ложкою рукою, нерѣдко боль въ членахъ и поясницѣ, запоръ и ознобъ попеременно съ жаромъ.

Въ сильной степени болѣзни, глаза и отчасти лицо красны.

Въ легкой степени достаточно (III—2); средство это повторить нѣсколько разъ, смотря по его дѣйствию; при томъ діэта № 1-й.

Но когда тянетъ къ рвотѣ и больной неохотно и съ трудомъ можетъ сидѣть, тогда главнымъ лекарствомъ служить рвотное (III—5). Когда больной отдохнетъ часа два послѣ рвоты, то давать ему, если у него не было нанизъ, (III—2) по рюмкѣ каждый часъ, пока подѣйствуетъ; потомъ (III—1 или 4). На слѣдующій день продолжать (III—1 или 4), такъ чтобы у больного каждый день было одинъ или нѣсколько разъ нанизъ. Въ противномъ случаѣ, это лекарство давать попеременно съ (III—2), какъ упомянуто выше.

Всего лучше когда больной ничего не ѣсть; во всякомъ случаѣ держать діету № 1-й.

Давать пить воды, или кисловатаго питья; всего лучше воды съ кремортартаромъ—какъ онъ хочетъ.

Какъ скоро послѣ рвоты будетъ довольно сильная боль подѣ ложкой и при томъ сильный жаръ

безъ испарины, то поставить подъ ложку 10—15 пиявокъ, а за тѣмъ теплыя припарки.

Когда языкъ сдѣлается чище и влажнѣе, жажда меньше, голова свободнѣе и появится аппетитъ, значить, что болѣзнь прошла. Лекарство оставить; держать діету № 2-й и наблюдать, чтобы выздо-равливающей немного ѣлъ и не простудился.

10. ГОРЯЧКА есть собственно такая же болѣзнь, какъ и показанная въ предыдущей статьѣ, такъ, что нерѣдко бываетъ трудно различить, когда прекращается желудочно-желчная лихорадка и начинается горячка. Существенное различіе состоитъ въ сильномъ приливѣ къ головѣ, такъ, что больной не можетъ сидѣть отъ дурноты головы, или у него дѣлается бредъ, доходящій иногда до изступленія и крика. При чемъ нерѣдко бываетъ боль подъ ложкою при давленіи рукою и глаза становятся красными. Прочіе признаки такіе же, какъ и въ (II—9)

Въ такомъ случаѣ (когда больной не можетъ сидѣть и бредить) вовсе не давать рвотнаго, хотя бы даже и языкъ былъ очень нечистъ, потому что отъ этого приливъ къ головѣ сдѣлался бы сильнѣе.

Давать (III—4) и попеременно (III—2), какъ показано въ (II—9). Въ чрезвычайно сильномъ жару и при короткомъ дыханіи, пустить три чашки крови, что можно повторить и чрезъ сутки въ

случаѣ надобности, то есть, когда жаръ, бредъ и короткое дыханіе не уменьшатся. Если же больной, напротивъ, скорѣе безчувственъ, нежели безпокоенъ, голова горяча и тяжела, то поставить по 6—8 піявокъ за каждое ухо, или къ каждому виску. Если, при ошупываніи живота и при давленіи его, есть боль, то поставить 10—15 піявокъ подъ ложкою, потомъ теплыя припарки. Во всякомъ случаѣ прикладывать холодныя примочки къ головѣ (Ш—23), или мелко разбитый ледъ или снѣгъ въ пузырь. къ икрамъ горчичники.

Больной не долженъ лежать въ жаркомъ мѣстѣ; не долженъ ѣсть, но больше пить.

Примѣчаніе. Бредъ состоитъ не въ томъ, что больной во снѣ или забытъ бредить: это бываетъ со всеми, одержимыми лихорадкою; но въ томъ, что въ бодромъ состояніи онъ или путается въ словахъ, или вовсе не можетъ отвѣчать.

Горячка эта—смотря по обстоятельствамъ—называется тифъ, нервная горячка, гнилая горячка и пр. Въ этой книгѣ, по ея объему, невозможно описать этихъ различій и зависящихъ отъ того способовъ пользованія; но въ большей части случаевъ достаточно и выше изложеннаго леченія.

11. ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ЛИХОРАДКА. Болѣзнь эта весьма часто случается въ селеніяхъ, ле-

жащихъ при рѣкахъ, или близь болотъ, которыя весною разливаются. Причины тѣ же самыя, какъ и показанныя выше (II—9). Впрочемъ, болѣзнь эта гибельна для поселянъ не отъ того, чтобъ она была сама по себѣ опасна — по крайней мѣрѣ въ Тульской губерніи; но отъ того, что ее весьма дурно лечатъ.

Признаки ея такіе же, какъ и въ (II—9).—Сверхъ того бываетъ свойственный ей припадокъ: ознобъ, жаръ и потъ въ извѣстныя, опредѣленныя времена, обыкновенно черезъ день; однако же озноба или пота иногда и не бываетъ.

Леченіе точно такое же, какъ и въ (II—9).

Главнымъ лекарствомъ служитъ рвотное, такъ, что отъ одного этого болѣзнь нерѣдко совершенно проходитъ. Иначе, надо употреблять (III—1) и давать это лекарство попеременно съ (III—2) при запорѣ. Діета № 1-й.

Сначала вовсе не должно заботиться о лихорадочныхъ припадкахъ: только во время озноба не давать пить теплаго, особливо вина или водки; иначе слѣдующій за тѣмъ жаръ будетъ слишкомъ силенъ.

Когда языкъ сдѣлается чище и влажнѣе, появится аппетитъ, и больной, въ свободные отъ лихорадки дни, станетъ чувствовать себя довольно хорошо, обыкновенно около недѣли послѣ того,

какъ начнется выше показанное леченіе, тогда—и не иначе какъ тогда только — наступитъ время прекращать лихорадочные припадки. Это дѣлается посредствомъ приѣма 6 хинныхъ порошковъ въ свободный отъ лихорадки день, по порошку черезъ два часа. Если припадокъ бываетъ всякій день, то порошки даются послѣ припадка, или когда начнется потъ. Какъ скоро и за тѣмъ припадокъ возобновится, то опять давать порошки такимъ же образомъ и въ такой же пропорціи. Послѣ того хорошо, въ продолженіе недѣли, давать одинъ порошокъ всякій разъ въ тотъ день и въ тотъ именно часъ, когда начиналась лихорадка.

Діета № 2-й.

Болезнь эта чрезвычайно легко возобновляется. При малѣйшей простудѣ, или отступленіи отъ діеты, она тотчасъ опять появляется. Если, въ такомъ случаѣ, языкъ чистъ и влаженъ и есть аппетитъ, также нѣтъ боли подъ лѣвыми ребрами—то можно тотчасъ-же давать хинные порошки; въ противномъ случаѣ, снова начать выше показанное леченіе.

По выздоровленіи—въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль — должно воздерживаться отъ жирныхъ пироговъ, яицъ, молока, соленой рыбы, и въ особенности остерегаться вечерняго воздуха.

Не смотря на все стараніе и на хорошее леченіе,

болѣзнь бываетъ иногда такъ продолжительна, что больной приходитъ въ совершенное изнуреніе. Въ такомъ случаѣ перемѣна мѣста часто остается единственнымъ средствомъ. Больнаго надо перевезти въ другую деревню, находящуюся на высокомъ мѣстѣ, гдѣ воздухъ чище, и тогда припадки обыкновенно прекращаются сами собою.

Противъ надлежащаго леченія этой болѣзни предпочитаютъ двоякимъ образомъ:

а) Больной, послѣ нѣсколькихъ припадковъ, покупаетъ себѣ въ аптекѣ хинныхъ порошковъ, и принимаетъ ихъ, не употребивъ предварительно слабительнаго. Припадки дѣйствительно прекращаются, но больной не выздоравливаетъ. Бываетъ ознобъ, слабость, отсутствіе аппетита, и цвѣтъ лица становится темнoblѣднымъ. Вскорѣ потомъ больной чувствуетъ боль и опухоль подъ ребрами, особливо лѣвыми; глаза и лицо дѣлается желтоватыми—словомъ, образуется *засаль* (широгъ). Впослѣдствіи брюхо становится полнѣе; нижнія конечности, и напоследокъ все тѣло, пухнутъ. Это водяная болѣзнь.

Если не будетъ подано скорой и надлежащей помощи, то больной умираетъ, потому что болѣзнь эта никогда не проходитъ сама собою или, крайней мѣрѣ, чрезвычайно рѣдко.

Въ этой книжкѣ нельзя означить способа лече-

нія. Онъ слишкомъ многосложенъ и требуетъ лекарствъ, которыя безъ рецепта не отпускаются изъ аптеки. Сверхъ того, леченіе это продолжительно и обходится дорого. По-этому, всего лучше помѣщику отправить такого больного въ больницу, потому что, не смотря даже на застарѣлость болѣзни, все еще можно надѣяться вылечить.

Или б) больной вовсе не употребляетъ никакихъ средствъ, полагая, что болѣзнь пройдетъ сама собою, или довольствуется простонародными средствами. Конечно, съ наступленіемъ лучшаго времени года, болѣзнь дѣйствительно нерѣдко прекращается; но всего чаще такіе люди, по нѣсколькуть, ходятъ какъ тѣни отъ изуренія, и счастливы еще, если сохранять жизнь. Вышеописанный лихорадочный заваль, съ его послѣдствіями, также обнаруживается, но постепенно, нежели послѣ неосмотрительнаго употребленія хинныхъ порошковъ. У больного дѣлается *изнурительная лихорадка*, водяная болѣзнь, и онъ умираетъ.

Относительно леченія здѣсь должно сказать тоже самое, что сказано о завалѣ.

Примѣчаніе. Изъ поселенъ, которые въ лучшемъ возрастѣ умираютъ отъ хронической болѣзни, можетъ быть, половина лишается жизни отъ послѣдствій дурнаго или небрежнаго леченія перемежающейся ли-

хорадки—такой болѣзни, которую въ началѣ весьма легко вылечить.

12. ПРОСТУДНАЯ ВОДЯНАЯ БОЛѢЗНЬ случается, по большой части, у людей, которые много бываютъ заняты тяжелою работою на холоду, при недостаткѣ питательной пищи.

При надлежащемъ леченіи болѣзнь скоро и благонадежно проходитъ; въ противномъ случаѣ, обращается въ обыкновенную водяную.

По всему тѣлу показывается опухоль, особливо на нижнихъ оконечностяхъ и на дѣтородныхъ частяхъ. Брюхо часто бываетъ кругло и полно отъ начинающейся брюшной водяной. Дѣлается большая слабость и скука; дыханіе становится короткимъ, и появляется кашель, при отсутствіи аппетита.

Сначала должно сводить больнаго въ баню, или посадить въ ванну, и натирать все тѣло два раза въ день простымъ виномъ или скипидаромъ. Потомъ (III—3) и теплѣ одѣвать.

Если языкъ нечистъ, то (III—1). Діета № 2-й. Языкъ, какъ обыкновенно бываетъ, скоро очищается, и появляется аппетитъ. Тогда давать питательную пищу и рюмку хорошаго травника; а вмѣсто (III—1) давать (III—10) столько, сколько больной выжить можетъ.

Примѣчаніе. Сначала болѣзнь эту легко принять за цынготную (II—22); но разница въ томъ,

что въ простудной водяной десны не пухнуть и на ногахъ нѣтъ синихъ пятенъ. Впрочемъ, лечение этой водяной часто бываетъ одинаково съ цынготною.

13. ПОНОСЪ можетъ случиться во всякое время года отъ простуды, или отъ неумѣренности въ пищу и питьѣ; но всего чаще въ августѣ мѣсяцѣ, когда ѣдятъ много незрѣлыхъ плодовъ и когда, послѣ жаркихъ дней, наступаютъ холодныя ночи и работники нерѣдко спятъ на землѣ подѣ открытымъ небомъ. Болѣзнь обнаруживается въ двухъ видахъ:

а) У больного нечистъ языкъ, горькій вкусъ, или вовсе нѣтъ никакого вкуса, тошнота, тянетъ рвать, головная боль.

Главнымъ лекарствомъ служитъ рвотное. Отнюдь не должно вдругъ останавливать поносъ, но давать (III—1).

Какъ скоро языкъ будетъ чище, головѣ легче, но поносъ все еще продолжается, то слѣдуетъ оставить (III—1) и давать (III—13) по 1 или по 2 столовыя ложки каждый часъ. Больной не долженъ ничего ѣсть, развѣ только одного киселя, и то немного. У него все еще сильная жажда. Не давать ему пить ничего кислаго, но отварной воды, ромашки или мяты, простуженой или теплой, какъ угодно, рисоваго отвара, сахарной воды, а всего лучше отвара изъ крупъ. Животъ натирать (III—5) и покрывать чѣмъ нибудь шерстянымъ.

б) Болѣзнь происходитъ по большой части только отъ простуды. Сильная, порывистая боль въ членахъ и въ брюхѣ, ознобъ, отсутствіе аппетита; но языкъ не слишкомъ нечистъ и никакого позова къ рвотѣ.

Больного сводить въ баню, а еще лучше посадить въ ванну, и чаще давать пить теплой ромашки или мяты. Потомъ (III—13). Если есть клещевинное масло, то хорошо давать его въ первый день по десертной ложкѣ чрезъ три часа. Брюхо натирать (III—3) и прикладывать къ нему теплаго овса. Если боль въ животѣ очень сильна, брюхо опухло и при легкомъ давленіи рукою есть боль, то поставитъ 10—15 шявокъ и дѣлать теплымъ припарки.

Примѣчаніе 1. Какъ скоро есть сомнѣніе, какимъ именно изъ этихъ двухъ родовъ поноса одержимъ больной, то всего лучше употребить леченіе, означенное подъ б).

Примѣчаніе 2. После всякаго поноса дѣлается запоръ. Тогда отнюдь не должно давать слабительнаго. Желудокъ требуетъ покоя, и какъ скоро выздоравливающий начнетъ немного ходить и вѣсть съ аппетитомъ, діета № 2, тогда у него само собою откроется нанизъ.

14. КРОВАВЫЙ ПОНОСЪ. Безпрестанный позывъ на низъ, нерѣдко разъ сто въ сутки. Сначала выходитъ слизь съ кровью, потомъ ничего. Какъ скоро

будет кало при испражненіи , то значить , что болѣзнь прошла.

Что сказано было о причинѣ и леченіи простаго поноса (II—15), тоже самое можно повторить и здѣсь; однако второй видъ болѣзни (б) случается чаще. Только въ кровавомъ поносѣ боль въ животѣ бываетъ чаще; по-этому півки и теплыя припарки нужнѣе.

Больные перѣдко останавливаютъ кровавый поносъ, въ особенности краснымъ виномъ , отъ чего могутъ происходить самыя опасныя воспаленія въ животѣ. Когда брюхо очень болитъ и надуто, по-ставить 13 півокъ и дѣлать теплыя припарки; если откроется сильная лихорадка и тѣло будетъ горячо , а дыханіе коротко , то пустить 3 чашки крови. Внутрь давать лекарство (III—15), но вмѣсто деревяннаго масла приготавливать его съ клеши-виннымъ масломъ; если же его нѣтъ , то (III—15) съ двумя столовыми ложками англійской , или глауберовой соли. Если испражненіе будетъ жидко, то давать просто (III—15).

По прекращеніи болѣзни, должно нѣкоторое время держать весьма строгую діету , по причинѣ большой слабости желудка.

Примѣчаніе. Испареніе испражненій заразительно; по этому , тотчасъ должно выносить тазъ и каждый разъ хорошеенько вымывать его.

15. **ХОЛЕРА** (не азиатская, но та, которая ежегодно открывается въ жаркое время года) состоитъ въ сильной рвотѣ и поносѣ, которые потомъ переходятъ въ позывъ къ рвотѣ съ сильнымъ напряженіемъ и въ позывъ на низъ.

Давать (III—15), если только больного не будетъ рвать этимъ лекарствомъ; иначе, пить хорошенько отваромъ овсяныхъ или ячменныхъ крупъ. Ванну, или теплыя припарки къ животу. Ничего не есть.

16. **ВОСПАЛЕНІЕ ВЪ ГРУДИ** изъ всѣхъ внутреннихъ воспаленій случается всего чаще, и открывается всего болѣе при наступленіи зимы, когда воздухъ очень сухъ и рѣзокъ, и когда дуетъ сильный вѣтеръ.

Главный признакъ есть закладываніе груди, съ чѣмъ, по большей части, сообразуется и лечение. Сверхъ того боль въ груди, кашель — сухой или съ тягучею мокротою, иногда съ кровью. Больной часто вовсе не можетъ лежать, или только на одномъ боку. Лихорадка; тѣло и дыханіе горячія; нерѣдко раскрасѣвшіяся щеки и бредъ или тяжесть головы.

Главное средство кровопусканіе, чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, и не меньше 3 чайныхъ чашекъ. Больной тотчасъ почувствуетъ облегченіе, а это добрый знакъ. Весьма часто снова начинается заклады-

вать грудь по прошествіи 12—24 часовъ. Тогда опять смѣло можно пустить кровь, также 3 чашки. Если опять начало сильно закладывать грудь, особенно у молодыхъ полнокровныхъ людей, то можно и въ третій разъ пустить кровь, 2 — 3 чашки. Какъ и выше сказано, должно обращать особенное вниманіе на закладываніе груди и на короткое дыханіе. Какъ скоро больной можетъ глубоко вздохнуть, хотя и съ некоторою болью, значить, что болѣзнь прервана, хотя и не вылечена. Внутри давать (III—4) чрезъ полчаса по столовой ложкѣ. Если языкъ нечистъ, при томъ тошно и тянетъ рвать, а лицо желтовато, то давать за одинъ разъ (III—2). Иначе продолжать (III—4), и только при заворѣ давать попеременно съ (III—2).

Иногда продолжается колотье въ бокахъ даже и тогда, когда дыханіе, вѣдствие кровоутока, совершенно свободно. Въ такомъ случаѣ поставить ипанскую мушку къ больному мѣсту; однако же никогда не употреблять этого средства въ первые 6—7 дней болѣзни.

Діету должно строго держать; да и у больного сначала вовсе нѣтъ аппетита. Пить давать сколько ему угодно, всего лучше миндальнаго молока, или отвара крупъ съ сахаромъ. Не давать кислаго питья, котораго больному впрочемъ очень хочется.

Когда перестанет закладывать грудь и лихорадка почти прекратится, тогда начнет отделяться въ большомъ количествѣ, нерѣдко съ трудомъ, густая мокрота. Въ такомъ случаѣ употреблять (III—1) и сверхъ того медь, сахаръ или лакрицу, и натирать грудь деревяннымъ масломъ. Дѣта № 1-й.

Во время выздоровленія больной не долженъ выходить, или заниматься тяжелою работою: иначе, у него легко можетъ открыться чахотка.

Примѣчаніе. Такое воспаленіе въ груди во многихъ случаяхъ трудно отличить отъ простудной лихорадки. (II—2). Но дѣло не въ названіи. Если сильно заложить грудь и дыханіе будетъ коротко, то съ этимъ и должно сообразоваться и пустить кровь; потому что въ такомъ случаѣ лучше прибѣгнуть къ сильнѣйшему, чѣмъ къ слабѣйшему средству.

17. ВОСПАЛЕНІЕ ВЪ ЖИВОТѢ. Самыя обыкновенныя причины: простуда, быстро остановленные испраженіе желчью или кровавый поносъ, также быстро остановившееся мѣсячное очищеніе или геморрой, обремененіе желудка, особливо простымъ виномъ, яды, понои и проч.

Признаки: сильная постоянная боль, обыкновенно подъ ложкою, или подъ правыми ребрами,

усиливающаяся при давленіи рукою; напряженность или раздутіе живота; рвота употребленной пищею, большая слабость и тоска, лихорадка иногда съ жаромъ, а иногда съ холоднымъ потомъ.

Леченіе должно быть преимущественно наружное, тѣмъ болѣе, что внутреннее лекарство часто выходитъ рвотою.

Пустиль три чашки крови и особливо поставитъ 20—40 пиявокъ къ больному мѣсту. Потомъ натирать политанью; прикладывать большія теплыя припарки, и чаще перемѣнять ихъ.

Ничего не ѣсть; напротивъ же того, пить воду, миндальное молоко, отваръ изъ крущъ, чѣмъ болѣе, тѣмъ лучше.

Примѣчаніе. Болезнь эту, которая впрочемъ бываетъ многихъ различныхъ видовъ, нерѣдко трудно отличить отъ коликъ, особливо когда много вѣтровъ, и отъ спазмовъ; однако при коликахъ боль не всегда постоянна, а иногда и прекращается, да и когда давши рукою, то не такъ больно, какъ при воспаленіи; при томъ, часто бываетъ бурчаніе въ животѣ. Сверхъ того должно принимать въ соображеніе вышеприведенныя причины. Въ случаѣ сомнѣнія, скорѣе слѣдуетъ лечить болѣзнь какъ воспаленіе по вышеизложенному наставленію.

Болезни отъ полнокровія.

ОБЩЕЕ ПРИМѢЧАНІЕ. Естественное средство отъ полнокровія—кровоусканіе, которое однако же часто употребляется во зло. Простолюдинъ смотритъ на него какъ на общее (универсальное) средство, не зная вредныхъ послѣдствій отъ частаго употребленія его. Тѣмъ не меньше для сильныхъ, полнокровныхъ людей, отправляющихъ много тяжелой работы, кровоусканіе нерѣдко бываетъ необходимымъ; однако же одинъ и небольшое двухъ разъ въ годъ, и то преимущественно весною. Сначала должно хорошенько осмотрѣть такихъ людей. Они обыкновенно жалуются на боль и тяжесть рукъ и на тяжкое дыханіе. Если при томъ языкъ бѣлый, тошнота и отсутствіе аппетита, то сперва нѣсколько дней давать за одинъ пріемъ (III—2), спокойное состояніе и діета. Если же это не поможетъ, и особливо если человекъ прежде того привыкъ къ кровоусканію, то пустить ему 3 чайныя чашки крови.

Во время ежемѣсячнаго очищенія у женщинъ, пускать имъ кровь въ случаѣ только крайней опасности, на примѣръ: при воспаленіи въ груди или въ животѣ. Впрочемъ см. (III—51).

48. КРОВОТЕЧЕНІЕ ИЗЪ НОСА обыкновенно

очень здорово и скоро проходить. Если будет идти такъ много крови, что больной ослабѣетъ, то вымыть ему всю голову холодною водою, шаринговать ею, смѣшавъ съ уксусомъ, въ носу; если же и тогда кровотеченіе не уймется, то заткнуть носъ корпиею, напитавшою уксусомъ. Внутрь — кремортартаръ.

19. АПОПЛЕКСИЧЕСКІЙ УДАРЪ, ПАРАЛИЧЪ.
Больной лежитъ безъ чувствъ и хрипитъ. Красное, опухлое или синее лице, естественная теплота тѣла; жаръ въ головѣ.

Примѣчаніе. Напередъ должно разспросить у домашнихъ и удостовѣриться, нюхая дыханіе мнимаго больного, не пьянъ ли онъ.

Тотчасъ пустить 4 чашки крови, что повторить чрезъ нѣсколько часовъ, если больной не придетъ въ чувства. Потомъ льдисто-холодными примочками къ головѣ. Ноги держать какъ можно теплѣе, всего лучше класть къ нимъ бутылки съ горячею водою. Воздухъ въ комнатѣ долженъ быть свѣжъ и чистъ; голову класть высоко.

Какъ скоро больной придетъ нѣсколько въ себя, надо узнать, гдѣ параличъ. Обыкновенно поражается имъ одна сторона тѣла. Пораженную часть должно хорошенько натирать, всего лучше камфарнымъ спиртомъ или летучею мазью; если же этого нѣтъ подъ рукою, то хорошимъ простымъ

виномъ. Чѣмъ скорѣ натирать, тѣмъ лучше. Въ особенности хорошенько натирать внутреннюю поверхность руки и ляжки, и потомъ обвертывать чѣмъ вибудь шерстянымъ.

Если больной можетъ глотать, то давать (III—2) чрезъ полчаса, или кремортартаръ.

Параличъ обыкновенно не проходитъ довольно долго. Каждый день натирать 2 раза камфарнымъ спиртомъ, или простымъ виномъ.

20. ГЕМОРОЙ (почечуй) не очень часто бываетъ у крестьянъ, но еще рѣже случается лечить его у нихъ. Здѣсь разумѣются только геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ. Иногда онѣ бываютъ очень велики и съ болью.

Чаще натирать ихъ деревяннымъ масломъ и прикладывать къ нимъ теплыя припарки, или натирать бѣлильною мазью съ осьюю частью камфары. При чемъ больной долженъ остерегаться холодныхъ ретирадныхъ мѣстъ, гдѣ дуетъ вѣтеръ.

Если показанныя средства не помогутъ, то обратиться къ врачу, который можетъ вырѣзать шишки.

21. КРОВОХАРКАНЬЕ, КРОВОПЛЕВАНЬЕ. Здѣсь разумѣется кровохарканье, случающееся у людей впрочемъ здоровыхъ, отъ ушибовъ, чрезвычайно сильныхъ напряженій, напимѣръ: послѣ усиленнаго бѣга, крика, испуга, или отъ неумѣреннаго употребленія вина. Больной кашляетъ, тяжело ды-

шеть, страдаетъ сильнымъ біеніемъ сердца и выплевываетъ много пѣнистой крови.

Тотчасъ пустить 3—4 чашки крови и, въ случаѣ нужды, повторить это черезъ сутки. Внутрь принимать вдругъ 1 десертную ложку поваренной соли на стаканъ воды, повторивъ это нѣск. олько разъ; потомъ (III—4), или кремортартаръ. Діета № 4-й.

Если расположеніе къ кровохарканью не пройдетъ, то больнаго нѣкоторое время не допускать къ работѣ, и давать ему пить сыворотку, приготовленную посредствомъ квасцовъ (III—7).

Хроническія (долговременныя) болѣзни.

22. **ЦЫНГОТНАЯ БОЛѢЗНЬ** (скрбутъ) бываетъ иногда эпидемическая (появляющаяся) въ неурожайные годы, особливо при неурожаѣ капусты, и открывается по большей части весной.

Мягкія, синевато-красныя десны, дурной запахъ изъ рта, шатающіеся зубы, утомленіе при малѣйшемъ движеніи и короткое дыханіе. Въ сильной степени болѣзни, черновато-синія пятна и опухоль на берцахъ; одутое лицо, а иногда и язвы грязно-красныя, изъ которыхъ при давленіи легко идетъ кровь. При томъ не охота къ движенію и скука.

Главное средство — ежедневно употреблять 1—2 имона съ кожею. Если же ихъ нѣтъ, то лукъ, рѣнь и горчицу, сколько можно больше, также клюкву.

Если будетъ опухоль, то натирать ее два раза въ день уксуомъ, а къ язвамъ привязывать корню, намоченную уксуомъ. Больной долженъ быть по большей части на солнцѣ, и дѣлать больше движенія, хотя ему этого и не хочется. Пищу употреблять укрѣпляющую — мясную и рюмку травнику.

Если скоть выговляется на паству, то очень здорово пить какъ можно больше молока.

25. ЖЕЛТУХА, вообще болѣзнь незначительная. Больной долженъ только пребыть нѣсколько дней дома, держать діету и употреблять (III—8).

Если же языкъ нечистъ, тошнота, отсутствіе аппетита, то (III—2) или еще лучше кремортартаръ съ ревеннымъ порошкомъ, по равнымъ частямъ, по 1 чайной ложкѣ чрезъ три часа.

Но если желтизна не пройдетъ, а сдѣлается даже черноватою, при чемъ животъ будетъ раздуть, съ болью при давленіи рукою, то значить, что болѣзнь весьма значительна; тогда отправить боль-

наго въ больницу, или, по крайней мѣрѣ, къ врачу.

24. ЧЕСОТКА есть сыпь съ зудомъ, начинающаяся между пальцами и отсюда распространяющаяся по другимъ частямъ тѣла. Она прилипчива.

Въ легкой степени болѣзни, натирать больныя мѣста чесоточною мазью, отпускаемую изъ аптеки или приготовляемую дома изъ 1 части сѣрнаго цвѣта и 2 частей свиного сала. При чемъ давать внутрь, 5 раза въ день, по чайной ложкѣ сѣрнаго цвѣта. Если же болѣзнь давно уже продолжается и распространилась по другимъ частямъ тѣла, то сверхъ того, давать (III—9).

25. ЛИШАИ могутъ быть на всѣхъ частяхъ тѣла. Это сыпь, болѣе или менѣе круглая, резко обозначающаяся, съ сильнымъ зудомъ, то влажная, то сухая. Иногда бываетъ она наследственная, такъ что цѣлыя семейства страдаютъ ею.

Лечение часто бываетъ самое трудное и продолжительное. Дома слѣдуетъ испытать (III—9) и держать строгую діету, доведенную до голоданія. Наружныхъ лекарствъ не нужно.

Должно остерегаться часто употребляемой бѣлильной мази.

Если показанное средство не поможетъ, то надо отправить больного къ врачу, или въ больницу.

Примѣчаніе. Во всѣхъ нахожныхъ болѣзняхъ діета есть главное дѣло. Въ особенности остерегаться всего кислago и жирнаго.

26. ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ чаще случается въ деревняхъ, нежели обыкновенно полагаютъ. Въ этой книгѣ невозможно описать леченіе этой болѣзни, которая весьма многосложна, и притомъ это леченіе продолжительно и дорого обходится, такъ, что въ селеніяхъ оно почти невозможно.

Принимая въ соображеніе заразительность этой болѣзни, которою нерѣдко занемогаютъ цѣлыя селенія и которая, въ такомъ случаѣ, съ чрезвычайнымъ трудомъ искореняется, слѣдуетъ настоятельно совѣтовать помѣщикамъ — какъ для собственной ихъ пользы, такъ и въ видахъ человеколюбія, тотчасъ же отправлять такихъ людей въ больницу.

О венерической болѣзни у дѣтей см. (II—41).

27. СВИНЦОВАЯ БОЛѢЗНЬ нерѣдко случается на заводахъ, гдѣ производится много работы изъ металловъ, особливо изъ свинца, мѣди, ртути, мышьяка и пр. или у мастеровъ, на пр. у маляровъ, которые употребляютъ въ краску металлическія вещества.

Блѣдность лица, худощавость, дрожаніе рукъ и ногъ, впалое брюхо и сильный запоръ.

Должно возстановить правильное испражненіе, особливо посредствомъ клещевиннаго масла по 1

столовой ложкѣ каждый часъ, пока подѣйствуетъ, или посредствомъ ревеня, по 1 чайной ложкѣ чрезъ два часа, пока подѣйствуетъ. Если опять будетъ запоръ, то повторить то же лекарство. Велѣдь за тѣмъ ванны. Чрезвычайно полезно размѣшать въ ваннѣ 10—12 золотниковъ сѣрной печени.

Вода не должна быть слишкомъ тепла, для того чтобъ больной могъ дольше сидѣть въ ней; по крайней мѣрѣ часть.

Само собою разумѣется, что больной довольно долгое время не долженъ быть допускаемъ къ вредной работѣ. Лучшая для него пища молочная.

28. ЗАПОЙ бываетъ по большей части у тѣхъ, которые прежде предавались пьянству и стараются отвыкнуть отъ этого порока.

Проведя нѣсколько времени въ трезвомъ состоянн, больной вдругъ чувствуетъ непреодолимую охоту къ вину, съ мучительною тоскою и безпокойствомъ, отъ которыхъ можетъ избавиться только употребленіемъ вина до безчувственности. Съ пробужденіемъ отъ этого состоянн, снова пробуждается и непреодолимое влеченіе къ вину. Такъ проходитъ одна или двѣ недѣли, пока послѣдуетъ совершенное расслабленіе.

Главное средство чай изъ богородской травы (*herba serpylli*), 1 полную щепоть на два стакана кипятка. Когда начинается припадокъ, давать по

чайной чашкѣ чрезъ полчаса. Если будетъ рвота, то давать рѣже; на другой день чрезъ 2 часа; въ послѣдующіе же дни отъ 4 до 6 разъ ежедневно. Во время припадка больной безпрестанно требуетъ вина, котораго рѣшительно не надобно давать ему. Нислаго питья можетъ онъ употреблять сколько угодно.

29. БѢЛАЯ ГОРЯЧКА (*delirium tremens*) случается обыкновенно послѣ сильнаго душевнаго потрясенія у людей, которые довольно долгое время постоянно предавались пьянству. Трясеніе, безпокойство, совершенное безпамятство съ страшными видѣніями, отсутствіе аппетита, и бессонница, иногда продолжалась нѣсколько недель. Жаръ бываетъ рѣдко; но при томъ постоянное отвращеніе отъ вина.

Признаки эти малѣ по малу исчезаютъ, и если только больной заснетъ спокойнымъ продолжительнымъ сномъ, то припадокъ проходитъ.

Давать только прохладительнаго питья, всего лучше кремортартару; впрочемъ оставить больного на свободѣ подъ благонадежнымъ присмотромъ и давать ему ходить тѣмъ больше, тѣмъ лучше.

Само собою разумѣется, что единственное, настоящее леченіе этихъ двухъ послѣднихъ болѣзней состоитъ въ воздержаніи отъ вина.

30. СУХОТКА. Подъ этимъ названіемъ разумѣется не исхудалость, бывающая послѣ трудныхъ болѣз-

ней, или сопровождающая чахотку, но исхудалость, которая случается безъ видимаго болѣзненнаго состоянія, особливо на груди и рукахъ, и причиняетъ большую слабость и наконецъ смерть.

На лекарства противъ этой болѣзни нельзя много надѣяться. Главное дѣло питательная, удобоваримая пища: особливо мясной отваръ, молоко и яйца въ смятку.

Обыкновенно показывается опухоль на животѣ. Прикладывать на все брюхо гуммозный пластырь, а если при томъ есть боль, то поставить пиявокъ.

51. ОДЫШКА (астма). Короткое дыханіе съ перхотою и хрипѣніемъ въ груди отъ накопленія мокроты. Обыкновенно продолжается нѣсколько лѣтъ; иногда почти проходитъ, но по какому нибудь поводу снова обнаруживается.

Леченіе такое же, какъ и (II—50). Только надобно всегда носить фонтанели на рукахъ или на груди, что между крестьянами очень трудно, или даже невозможно.

Примѣчаніе. Въ этой болѣзни не должно часто пускать кровь, развѣ только одинъ или два раза въ годъ, хотя больные, во время припадка, всегда требуютъ этого. Въ противномъ случаѣ, скоро можетъ открыться водяная.

Во время припадка довольно однихъ горчичниковъ.

Женскія болѣзни.

Женщины могутъ имѣть всѣ тѣ болѣзни, о которыхъ было говорено выше. Сверхъ того есть многія, зависящія отъ природы женщинъ.

52. МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ.

а) Это *очищеніе* въ нашемъ климатѣ *называется* отъ 15 до 15-лѣтняго возраста. Если же оно остановится и дѣвица будетъ здорова, то противъ этого ничего не должно дѣлать. Но ежели каждый мѣсяць, или въ другія времена, будетъ боль въ поясищѣ или въ животѣ, раздутіе боковъ, напряженіе груди съ болью и напоръ на дѣтородныя части, то въ это время ставить ноги въ теплую воду и пить побольше ромашки. А какъ скоро это не поможетъ, то пустить кровь изъ ноги. Если же и тогда не будетъ пользы и окажутся сильнѣйшіе припадки болѣзни, то должно обратиться къ врачу.

Въ продолженіе очищенія, особливо въ началѣ, дѣвица должна остерегаться простуды, а еще болѣе ретиранныхъ мѣсть, гдѣ дуетъ холодный вѣтеръ.

Рвотнаго и слабительнаго употреблять не должно.

Примѣчаніе. Послѣ продолжительныхъ болѣзней, когда больная очень похудѣетъ, очищеніе обыкновенно не открывається нѣсколько мѣсяцовъ. Это весьма естественно, и противъ

этого ничего не должно дѣлать. Съ востановленіемъ здоровья, очищеніе мало по малу открывается само собою. Къ сожалѣнію, часто бываетъ, что въ такихъ случаяхъ совѣтуются съ старухами, которыя тотчасъ предлагаютъ возбуждающія средства.

б) ПРЕКРАЩЕНІЕ МЯСЯЧНАГО ОЧИЩЕНІЯ иногда случается по неизвѣстной причинѣ и безъ всякаго вреда. Въ такомъ случаѣ оставить безъ леченія.

Но обыкновенно это случается въ слѣдствіе сильнаго огорченія, простуды, особливо ногъ, или въ ретирадномъ мѣстѣ, или отъ неумѣренности въ пищѣ. Если въ животѣ или въ другомъ мѣстѣ есть боль, и притомъ лихорадка, то поставить 15 пиявокъ къ внутреннимъ и верхнимъ сторонамъ ляжекъ, или еще лучше къ между-проходной, и потомъ сѣсть въ ванну, или поставить ноги въ теплую воду; употребить промывательное и приложить къ дѣтороднымъ частямъ губку, налитваную теплымъ чаемъ изъ ромашки и перемѣнять почаще. Пить побольше ромашки.

Примѣчаніе. Если мясичное очищеніе остановится (т. е. не будетъ его въ надлежащее время), то должно какъ можно точнѣе изслѣдовать, не происходитъ ли это отъ беременности. Въ послѣднемъ случаѣ конечно не употреблять никакого средства.

в) ЧРЕЗМѢРНОЕ МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ узнается не по количеству вышедшей крови, но по послѣдствіямъ.

Слабость, часто доходящая до обморока, короткое дыханіе, холодъ и къ вечеру опухоль въ ногахъ, показываютъ, что вышло слишкомъ много крови. Иногда очищеніе продолжается отъ одной недѣли до двухъ; иногда кровь идетъ безпрестанно жидкая или кусками.

Посредствомъ клистирной шприцовки шприцовать каждый день 3—4 раза внутри дѣтородныхъ частей, взявъ для этого 1 часть уксуса на 3 части холодной воды. Давать пить сыворотку, приготовленную посредствомъ квасцовъ (III—7), по 1 рюмкѣ чрезъ два часа, и вмѣстѣ съ тѣмъ чай изъ 1 золотника корицы на 2 чайныя чашки кипятка по нѣскольку разъ въ день. Если это не поможетъ, то обратиться къ врачу.

г) МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ СЪ БОЛЮ. Боль ощущается или за нѣсколько дней до открытія кровей, или во время ихъ.

Ванна и потомъ теплыя припарки къ животу и къ дѣтороднымъ частямъ; а передъ тѣмъ хорошенько натереть эти части деревяннымъ масломъ. Пить побольше ромашки.

Обыкновенная причина — полнокровіе, которое узнается по біенію въ вискахъ, потемнѣнію въ

глазахъ при наклоненіи головы и по тяжелому дыханію. Въ такомъ случаѣ пустить кровь изъ ноги и поставить ноги въ теплую воду. Впрочемъ, должно всячески стараться узнать настоящую причину и поступать сообразно съ нею.

д) ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ МѢСЯЧНАГО ОЧИЩЕНІЯ случается обыкновенно на 45 году. По большей части оно бываетъ безъ дальнѣйшихъ послѣдствій; если бы даже и была небольшая тошнота, то не употреблять никакихъ средствъ. Не часто случаются головныя боли, закладываніе груди, боль въ животѣ и рвота кровью. Въ такомъ случаѣ полнокровнымъ пускать кровь 1 или 2 раза въ годъ. Сверхъ того давать кремортартаръ, или (III—4); если языкъ нечистъ, то (III—2).

35. БѢЛИ. Если онѣ бывають до начала мѣсячнаго очищенія, или вскорѣ послѣ окончательнаго прекращенія его, то ничего не значать и проходить сами собою. Но если онѣ продолжительны, то давать нѣкоторое время ревеню по 1 чайной ложкѣ чрезъ 3 часа, и заставлять больную дѣлать побольше движенія. Впослѣдствіи шприцевать по нѣскольку разъ въ день внутрь дѣтородныхъ частей известковою водою (III—26).

Если бѣли желтаго цвѣта, зловонны и такъ остры, что отъ нихъ краснѣетъ тѣло на дѣтородныхъ частяхъ, то, кромѣ обмыванія часемъ изъ ро-

ванки, не употреблять никакого наружнаго средства. Сверхъ ревеню давать еще (III—9). Какъ скоро бѣли перестануть быть зловонными, тогда шприцевать известковою водою и, въ дополненіе къ леченію, употреблять сыворотку, приготовленную посредствомъ квасцовъ (III—7). Строгая діета до голоданія. Купанье въ рѣкѣ весьма полезно.

34. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ въ низшемъ классѣ народа обыкновенно бываютъ правильны и естественны, и потому на этотъ предметъ предлагаются въ этой книгѣ только нѣкоторыя краткія правила о содержаніи себя.

Беременная женщина не должна усиленно работать. Выкидываніе легко случается въ особенности отъ поднятія большихъ тяжестей. Должно остерегаться всякой неумѣренности въ пищѣ и питіи, и по возможности избѣгать сильныхъ душевныхъ потрясеній.

Полнокровнымъ пускать кровь, когда онѣ чувствуютъ тяжесть и круженіе головы съ біеніемъ въ вискахъ, при тяжеломъ дыханіи и боли въ рукахъ. Лучшее для того время—3-й или 8-й мѣсяць беременности.

Женщина, разъ выкинувшая, легко можетъ снова тому подвергнуться, и почти въ то же самое время. Въ такомъ случаѣ надо пустить кровь на 3 мѣ-

сяцъ беременности и воздерживаться отъ всякой работы. (I—III) это атванд, опэвоф джурра

• Относительно содержанія груди см. (II—36).

• При запорѣ, который весьма часто случается во время беременности, не слѣдуетъ давать сильныхъ слабительныхъ, особливо если женщина сама кормитъ ребенка. Держать только легкую діету, дѣлать много движенія, а если этого недостаточно, то ставить промывательныя.

Послѣ родовъ надо заботиться, чтобы свободно было на-низъ. Для этого ставить промывательныя и, въ случаѣ дѣйствительной надобности, давать по 1 столовой ложкѣ клещевиннаго масла чрезъ 3 часа до дѣйствія. Сильныя слабительныя прогоняють молоко.

• Если бы родовое очищеніе вдругъ остановилось, обыкновенно отъ простуды или отъ сильного огорченія, то давать побольше пить ромашки, шпринцовать ромашкою дѣтородныя части и прикладывать къ нимъ губку, напитанную теплою ромашкою, и почаще перемѣнять ее.

• При сильныхъ натугахъ дѣтородныхъ частей послѣ родовъ употреблять тоже самое и сверхъ того, если можно, ванну.

• Если послѣ родовъ мѣсто не скоро выдетъ, то не дергать слишкомъ сильно пуповину, но взять

насутни теривніе. Если же будетъ сильно идти кровь прежде, нежели выдетъ мѣсто, то это весьма опасно. Въ такомъ случаѣ все зависитъ отъ рѣшительности и ловкости повивальной бабки, которая бы умѣла тотчасъ вынуть мѣсто, и этотъ случай гѣмъ опаснѣе, что въ деревняхъ нѣтъ возможности своевременно имѣть надлежащую помощь и нужныя для того лекарства. Родильницѣ тереть брюхо сибгомъ или холодною водою, и шприцевать въ матку холодною водою пополамъ съ уксусомъ. Пока еще больная имѣетъ довольно силы кричать и пока тѣло у нея тепло, давать побольше кисловатаго питья, или кремортартару.

Если же силы такъ ослабѣютъ, что родильница сдѣлается совершенно холодною и блѣдною, губы посинѣютъ и выступитъ холодный потъ на рукахъ, то это самая крайняя опасность, хотя бы даже вышло и мѣсто. Тогда давать чай изъ 1 золотника корицы на 2 чайныя чашки кипятка, прибавивъ немного вина или водки. За неимѣніемъ корицы, давать обыкновеннаго чаю.

55. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ РОДИЛЬНАЯ ГОРЯЧКА начинается только въ первыя двѣ недели послѣ родовъ. Груды вдругъ опадаютъ, въ нихъ вовсе нѣтъ молока, и родовое очищеніе прекращается. Дѣлается опухоль живота съ самою сильною болью, иногда болѣе въ верхней, а иногда болѣе

въ нижней части живота. Тѣло чрезвычайно горячо, языкъ сухъ и нечистъ, сильная жажда и закладываніе груди.

Болезнь эта чрезвычайно опасна и требуютъ сильныхъ средствъ. Тотчасъ пустить 5 чашки крови, и повторять это чрезъ сутки, если бы горячка и боль не утихли; потомъ 20 піявокъ, выше или ниже, смотря потому, гдѣ боль сильнѣе; притомъ два раза въ день натирать животъ политанью, а затѣмъ теплыя припарки, перемѣняя ихъ чрезъ два часа. Внутрь давать (III—4) по 2 столовыя ложки чрезъ часъ. Стараться открыть родовое очищеніе средствами, изложенными выше (II—54). Должно хорошенько высасывать груди. Строгая діета и въ особенности не давать мяснаго навару.

Примѣчаніе. Главныя лекарства отъ этой болѣзни не отпускаются изъ аптеки безъ рецепта. Но какъ болѣзнь эту легко узнать, то, въ случаѣ опасности, должно отнести письменно къ врачу, который, не выдавъ больной, очень легко можетъ предписать нужное лекарство.

36. БОЛѢЗНИ ГРУДЕЙ. Еще во время беременности женщина должна держать груди въ надлежащей теплотѣ, предохраняя ихъ отъ давленія и простуды. У тѣхъ, которыя беременны въ первый разъ, надо осмотрѣть соски, довольно ли они велики; если недостаточно велики, то каждый день вытягивать

ихъ по нѣскольку разъ и покрывать высверленнымъ кускомъ дерева такъ, чтобы край этого куска плотно приходился къ самому объему сосковъ.

а) **ВОСПАЛЕНИЕ ГРУДЕЙ.** Небольшая боль съ ознобомъ всегда бываетъ послѣ родовъ и называется доброкачественною родильною лихорадкою. Она не требуетъ леченія, развѣ только (III—8), и растирать груди камфарною мазью.

Но если боль сдѣлается сильнѣе и покажется красная опухоль, то держать строгую діету и покрывать груди хлопчатою бумагою, прокуренною сахаромъ; если же это не поможетъ, то поставить 10—15 пиявокъ и натирать груди камфарнымъ масломъ, прикладывая теплыя припарки, а груди подвязывать. Сначала можно продолжать кормить ребенка; но если боль и опухоль чрезъ нѣсколько дней не пройдутъ, то кормить ребенка другою грудью, если она здорова, или отнять его отъ груди.


б) **НАГНОЕНИЕ ГРУДЕЙ.** Если воспаление не разобьется и грудь въ больномъ мѣстѣ сдѣлается мягкою и поднимется, то значить, что въ ней нарывъ отъ нагноенія. Къ груди прикладывать милотный или гуммозный пластырь (вытяжной), и когда нарывъ прорвется, промывать его каждый день нѣсколько разъ ромашкою и продолжать прикладывать пластырь.

в) УЗЛОВАТЫЯ ЗАТВЕРДѢНІЯ ВЪ ГРУДЯХЪ. дѣлаются послѣ воспаленія, или послѣ отнятія ребенка отъ груди. Натирать груди политанью 2 раза въ день и прикладывать къ нимъ теплыя припарки; а на ночь пластырь изъ болиголова (*emplastrum sicutae*). Если затвердѣнія перейдутъ въ нагноеніе, тогда лечить какъ показано (36—б).

г) РАКЪ ВЪ ГРУДЯХЪ различается отъ узловатыхъ затвердѣній тѣмъ, что твердый нарывъ не разбивается выше приведенными (56—в) средствами и что больная чувствуетъ въ груди колючую, быстро и рѣзко повторяющуюся боль, равно и тѣмъ, что нарывъ давно уже начался. Въ такомъ случаѣ надобно какъ можно скорѣе обратиться къ врачу, потому что операція есть единственное вѣрное средство. Если же напротивъ будутъ медлить до тѣхъ поръ, когда нарывъ приростетъ къ ребрамъ и даже прорвется, то операція невозможна, и больная не можетъ уже быть вылечена.

Примѣчаніе. Должно остерегаться лекарей-простолудиновъ, которые противъ этой болѣзни употребляютъ сильныя средства съ мышьякомъ. Опухоль отъ этого дѣлается меньше, но больная почти всегда умираетъ отъ этого сильнаго и вреднаго леченія.

д) МАЛОЕ ОТДѢЛЕНІЕ МОЛОКА. Груды дѣлаются повислыми; ребенокъ голоденъ и безпокоенъ, а иногда и боленъ, потому что молоко, при маломъ



лучше пускать молоко въ глазъ съ чайной ложки и ватка потирать вѣко. Относительно испражнений, наблюдать сказанное выше (II—37). Въ комнатѣ должно быть не слишкомъ свѣтло. Очень хорошо сажать ребенка въ теплыя ванны.

41. ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ. Дети дѣлаются худощавыми и старообразными. Въ горлѣ и во рту открываются язвы грязныя, довольно большія и глубокія. На дѣтородныхъ частяхъ и заднемъ проходе показывается краснота, кожа слѣзаетъ, или образуются язвы. Для того чтобъ удостовѣриться въ болѣзни, должно хорошенько осмотрѣть родителей, или домашнихъ и ближайшихъ людей. Относительно леченія, должно слѣдовать сказанному выше (II—26). Мать съ ребенкомъ отправить въ больницу.

При этомъ слѣдуетъ упомянуть о двухъ болѣзняхъ, часто случающихся у дѣтей, но отнюдь не венерическихъ.

а) НЕЗАЛУПА. Кожа на концѣ дѣтородной части у мальчиковъ такъ распухаетъ, что ребенокъ съ трудомъ выпускаетъ мочу. Сначала опухоль бываетъ красна и съ болью, потомъ становится больше и дѣлается блѣдною и водянистою.

Прикладывать корнiю, напитанную свинцовою водою, и смотрѣть, чтобъ корнiя постоянно была влажна.

б) ОПУХОЛЬ ЯИЦЪ тѣмъ отличается отъ грыжи,

что ее нельзя вправить въ животъ. Прикладывать корпию, или холстинную тряпку, напитанную краснымъ виномъ, кипяченымъ съ гвоздикою, наблюдая, чтобы корпия или тряпка постоянно были влажны. Если краснаго вина и гвоздики нѣтъ, то вмѣсто ихъ употреблять свинцовую воду. Сверхъ того подвязывать бандажъ (II—60).

42. **ПОНОСЪ** происходитъ обыкновенно отъ кислотъ въ желудкѣ. Испражненіе бываетъ зеленое или желтое какъ рубленныя яйца, и весьма зловонное. При томъ пахнетъ иногда кислымъ изорта.

Поносъ не должно останавливать; но давать (III—12) пополамъ съ молокомъ, или раза два въ день магнезін, или дѣтскаго порошка, каждый разъ столько, сколько можно захватить концомъ перочиннаго ножа. Впрочемъ, поносъ этотъ обыкновенно проходитъ самъ собою. Если же не пройдетъ, то—когда испражненіе сдѣлается чисто-желтымъ и поносъ начнетъ изнурять ребенка — поставить промывательное изъ крахмала и давать пить отвара изъ риса.

Если поносъ часто случается, то причиною тому бываетъ обыкновенно мать или кормилица. Онѣ должны пить (III—12); употреблять мясную и молочную пищу и дѣлать побольше движенія. Въ рожокъ наливать свѣжаго молока и держать сосокъ въ чистотѣ. Животъ одѣвать потеплѣе.

43. РВОГА есть обыкновенно признак крѣпкаго ребенка. Когда она случится, то давать также дѣтскаго порошка, или магнезїи столько, сколько можно захватить концомъ перочиннаго ножа, 2 или 3 раза въ день, и осмотрѣть мать, какъ замѣчено выше (II—42). Если при томъ лихорадка, раздутіе живота и въ немъ боль при давленіи рукою, то поставить пѣвокъ къ больному мѣсту (по одной на каждый годъ ребенка), и когда кровь уймется, то прикладывать къ животу лоскутъ полотна, напитаннаго тепловатымъ молокомъ, и часто перемѣнять.

44. ЛИХОРАДКА. Жажда, жаръ во рту, горячее дыханіе и жаръ во лбу. Обыкновенно бываетъ достаточнымъ давать магнезїи или дѣтскаго порошка, а когда болитъ животъ, дѣлать молочныя примочки (II—45). Кормить бѣлымъ хлѣбомъ съ водою и сахаромъ и смотрѣть за кормилицею.

45. ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА весьма часто случается у дѣтей, которыя много кричатъ, и выходитъ иногда очень сильно наружу. Какъ скоро ребенокъ успокоится, грыжу осторожно выравить такъ, чтобы снаружи ничего не оставалось, и положить на пупокъ $\frac{1}{4}$ копѣйки, обернувъ ее полотномъ; потомъ приложить липкаго пластыря, намазаннаго на длинные полотняные лоскутъя.

Примѣчаніе. Бинтъ не годится, потому что если онъ будетъ достаточно придерживать $\frac{1}{4}$ копытки, то станетъ препятствовать свободному движенію живота, когда ребенокъ будетъ кричать.

46. ПРОРЪЗЫВАНІЕ ЗУБОВЪ начинается на 6 мѣсяцѣ, а иногда чрезъ годъ и два мѣсяца. Ребенокъ кричитъ, кладетъ въ ротъ пальцы или все, что ему даютъ; десны краснѣютъ и пухнуть; при томъ бываетъ лихорадка, сильный жаръ въ головѣ и обыкновенно поносъ.

Если поносъ силенъ, то его не должно останавливать и ничѣмъ не лечить.

Когда же поносъ остановится, или его вовсе не будетъ, то давать магнезій или дѣтскаго порошку, сколько нужно, для поддержанія умереннаго поноса, пока прорѣжется зубъ. Если голова слишкомъ горяча и даже посинѣетъ, то поставить по 4 шпикъ за каждое ухо и промыватьное изъ ромашки съ деревяннымъ масломъ и мыломъ. Холодные примочки къ головѣ. Кромѣ молока ничего не ѣсть.

Когда у ребенка 4 зуба, то пора отнять его отъ груди.

До этого времени всѣ лекарства очень просты и клонятся къ тому только, чтобы держать въ порядкѣ животъ и тѣмъ препятствовать приливанію

крови къ головѣ. Но съ этого времени ребенокъ начинаетъ вести жизнь болѣе самостоятельную, а вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣзни и способы леченія ихъ становится разнообразіе.

47. ЗОЛОТУХА бываетъ наследственная, особливо отъ пожилыхъ, нездоровыхъ, или зараженныхъ венерической болѣзнію родителей; часто также и отъ нечистоты, сырыхъ холодныхъ домовъ и нездоровой пищи.

Железовыя опухоли на шеѣ, сыпь и нарывы или язвы на разныхъ мѣстахъ тѣла, большой животъ, глазныя болѣзни и т. д., суть обыкновенные признаки золотухи.

Леченіе состоитъ, главнымъ образомъ, въ чистотѣ и здоровой пищѣ. Два раза въ недѣлю сажать въ тепловатую ванну, съ примѣсью 2 фунтовъ поваренной соли. Не давать картофелю или тяжелой (сдобной) мучной пищи и кислаго. Черезъ 3 или 4 дня давать слабительное изъ дѣтскаго порошку съ ревенемъ. Прекраснымъ средствомъ служить кофей изъ желудей, по половинѣ или по цѣлой чашкѣ два раза въ день. Этотъ кофей продается готовый въ аптекахъ; но его легко приготовить и дома. Хорошенько высушить зрѣлые желуды, облупить ихъ и поджарить, потомъ молоть какъ и всякій другой кофей. Можно давать его съ молокомъ и сахаромъ. Рыбій жиръ также очень

хорошее средство отъ золотухи, отъ 1 чайной до 1 десертной ложки, смотря по возрасту ребенка, три раза въ день. Сначала дѣти противятся этимъ средствамъ, однако очень скоро привыкають къ нимъ, и должно долгое время употреблять ихъ, потому что они хотя и медленно, но за то рѣшительно помогаютъ. Язвы и опухоли слѣдуетъ только держать въ чистотѣ. Если при раздутіи живота боль на ошупь рукою весьма сильна и при томъ животъ тугъ, то поставить 2—4 пиявки; потомъ приложить гуммознаго пластыря, и носить его довольно долгое время,

Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать на *золотушное воспаление глазъ*; потому что отъ него часто дѣлаются *бѣльма* на глазахъ, особливо при небрежномъ или дурномъ леченіи.

Больные глаза промывать тепловатымъ молокомъ, какъ сказано выше (II—40) и защищать отъ свѣта двумя полотняными тряпочками, привязанными ко лбу и опущенными на глаза въ видѣ занавѣсокъ (II—61). Если глаза очень красны и боятся свѣта, то поставить, смотря по возрасту ребенка, 1—3 пиявки къ каждому виску. Прочее внутреннее леченіе такое же, какое показано выше.

Если золотушное воспаление глазъ часто повторяется, то легко образуется бѣльмо на глазу, которое остается, хотя воспаление и проходитъ.

Сначала бѣльмо обнаруживается въ видѣ легкаго облачка; но потомъ становится бѣлѣе и гуще и можетъ совершенно помрачить зрѣніе.

Противъ этихъ бѣльмъ употребляются, какъ домашнія средства, различные острые вещества (въ здѣшней мѣстности преимущественно имбирный порошокъ), которыя всегда опасны и, особливо отъ незнанія дѣла, производятъ совершенную потерю зрѣнія. Если бѣльмо не очень застарѣло, то въ наукѣ извѣстны противъ него довольно благонадежныя средства, и потому чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, слѣдуетъ обратиться къ врачу.

48. АНГЛІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ есть собственно та же самая, которая означена выше (II—47), съ тою только разницею, что въ Англійской болѣзни кости дѣлаются мягкими, отъ того происходятъ выгибы, особливо ногъ и спиннаго позвонка.

Леченіе такое же, какъ и (II—47); только въ этой болѣзни, вмѣстѣ съ тѣмъ, хорошо каждый день натирать простымъ виномъ спину и икры. Летомъ ванны изъ песку, нагрѣтаго солнцемъ.

49. ПАРШИ происходятъ иногда отъ нечистоты; еще чаще отъ слишкомъ тяжелой мясной пищи, а всего болѣе отъ золотухи. Они состоятъ изъ сыпи на одной части головы или на всей головѣ; иногда бываютъ сухіе, иногда влажные и злобные.

Леченіе такое же, какъ и (II—47). Голову держать въ чистотѣ, вымывая тепловатою мыльною водою; но другаго наружнаго леченія не употреблять, потому что когда сыпь скроется, то распухнетъ брюхо и у ребенка откроется слѣдующая болѣзнь.

50. ДѢТСКАЯ СУХОТКА. Тугое, раздутое брюхо, сильный ащетить, при томъ исхудалость, особливо рукъ и ногъ. Поперемѣнно запоръ и поносъ. Тѣло дѣлается морщинистымъ, и дѣти принимаютъ старообразный видъ. Болѣзнь эта очень опасна, особливо если происходитъ отъ скрывшихся струпеевъ. Леченіе (II—47).

51. СКАРЛАТИНА. Сильная лихорадка съ неподвижностью шеи и съ жабою. Черезъ нѣсколько дней выходитъ мелкая сыпь на рукахъ, потомъ на груди и на прочихъ частяхъ тѣла, рѣдко на лицѣ; послѣ чего лихорадка утихаетъ. Черезъ 6—8 дней послѣ появленія сыпи кожа начинаетъ лупиться; затѣмъ лихорадка и жаба проходятъ.

Таковъ правильный ходъ этой опасной болѣзни, которая требуетъ только лекарства, показаннаго въ (III—1), по 1-й чайной или десертной ложкѣ каждый часъ. Въ особенности же надо остерегаться простуды и тяжелой пищи. Діета № 1-й. Всего лучше вовсе не давать ѣсть, но тѣмъ болѣе пить.

Однакоже весьма часто бываютъ случаи, требующіе особеннаго вниманія. Наиболѣе встрѣчаются слѣдующіе:

а) Необыкновенно сильная лихорадка, при чрезвычайно горячем тѣлѣ, сильной жаждѣ и красномъ сухомъ языкѣ. Употреблять (III—4) по 1-й чайной или десертной ложкѣ каждый часъ и чрезъ каждые 3—4 часа обмывать голову и все тѣло холодною водою, пока жаръ не утихнетъ.

б) Сильная головная боль, красное лицо, бредъ, виски бьются и красные глаза. Лечение такое же, какое показано выше, подъ лит. а, и сверхъ того, смотря по возрасту больного, 1—6 пиявокъ за каждое ухо.

в) Сильная жаба, угрожающая задушеніемъ. Поставить 1—6 пиявокъ къ шеѣ и потомъ натирать ее политанью 3 раза въ день. Внутри лекарство обыкновенно не глотається; въ случаѣ же возможности глотать (III—4).

г) Часто сыпь не выходитъ наружу, или, что еще хуже, появившись, скрывается. Въ такомъ случаѣ главнымъ лекарствомъ служить рвотное, всего лучше изъ бѣлаго купороса (*sepsim sulphuricum*), по 1-й чайной ложкѣ каждую четверть часа, какъ показано (III—5); потомъ горчичники къ животу.

Примѣчаніе. Почему можно узнать, дѣйствительно ли у больного скарлатина, когда вовсе нѣтъ сыпи? По сильному жару и тоскѣ, по жабѣ и неподвижности шеи, а главнымъ образомъ потому, когда болѣзнь господствуетъ въ той мѣстности.

д) Больной не долженъ выходить изъ комнаты до тѣхъ поръ, пока тѣло совершенно перестанетъ луниться: лѣтомъ чрезъ 4, а зимою чрезъ 6 недѣль. Малѣйшая простуда можетъ имѣть самыя опасныя послѣдствія. Сначала пухнуть вѣки, а потомъ, мало по малу, и все тѣло. Брюхо становится раздутымъ, а дыханіе тяжелымъ. Моча идетъ въ маломъ количествѣ и съ трудомъ.

Тогда немедленно посадить больного въ теплую ванну; потомъ натереть все тѣло простымъ виномъ и покрыть шерстянымъ одѣяломъ, для того чтобы произвести испарину. Внутри давать (III—4), какъ показано выше, или кремортартару въ сахарной водѣ и при томъ почаще (III—10) съ медомъ. Если сильная лихорадка, то поставить 2—6 пиявокъ подъ ложку, или взрослымъ дѣтямъ пустить 2—3 чашки крови. Горчичники къ икрамъ.

32. КОРЬ. Кашель, насморкъ, глаза бояться свѣта и красные; лихорадка и сыпь сначала на лицѣ, потомъ на рукахъ и наконецъ на всемъ тѣлѣ.

При легкой лихорадкѣ не нужно никакого леченія, только остерегаться простуды и держать діету. При сильной лихорадкѣ употреблять выше показанное леченіе (II—51).

Примѣчаніе. Последнія двѣ болѣзни часто бываетъ трудно отличить одну отъ другой, что впрочемъ и неважно, лишь бы леченіе согласовалось съ признаками болѣзни,

особливо съ лихорадочнымъ жаромъ. Во всякомъ случаѣ больной тогда только долженъ выходить изъ комнаты, когда совершенно выздоровѣеть (II—51, д).

Сверхъ того бываютъ разнаго рода сыпи, соединенныя съ лихорадкою, на примѣръ: настоящая оспа, ложная оспа, летучая оспа, крапивная лихорадка, которыя часто случаются и у взрослыхъ, такъ-же какъ и у дѣтей. Лечение всякой такого рода сыпи одно и тоже, какъ показано (II—32).

53. КОКЛЮШЪ (судорожный кашель) обыкновенно не требуетъ никакого леченія. Если погода не слишкомъ дурна, то полезно пускать ребенка на свѣжій воздухъ. Если кашель слишкомъ силенъ, то давать груднаго чаю съ медомъ, и тереть грудь два раза въ день деревяннымъ масломъ.

Полнокровнымъ дѣтямъ, у которыхъ во время кашля синѣетъ лицо, поставить 2—6 пиявокъ подъ ложку.

54. ГЛИСТЫ. Есть одинъ только вѣрный признакъ глисть, когда одна или нѣсколько глисть выдетъ наружу. Между тѣмъ, когда ребенокъ, свыше 3-ти лѣтъ, безъ всякой извѣстной причины худѣетъ, дѣлается синева подъ глазами и зудъ въ носу, причемъ онъ безпокойно спитъ и скрываетъ во снѣ зубами, то можно полагать, что у него глисты. Если бы даже ихъ и не было,

то средства противъ глисть безвредны. Лекарство употреблять во время ущерба луны.

Давать извѣстные цидварныя конфѣкты, или приготовить лекарство: столовую ложку цидварнаго сѣмени на двѣ столовыя ложки меду, и давать по чайной ложкѣ каждый часъ. По окончаніи этой порціи — слабительное, всего лучше клешевинное масло.

Маленькіе бѣлые червячки иногда держатся въ заднемъ проходѣ и причиняютъ тамъ сильный зудъ и безпокойство ребенку. Посредствомъ промывательнаго изъ молока съ большимъ количествомъ сахара, приманиваютъ ихъ къ самому проходу и часа чрезъ два послѣ того умерщвляютъ ихъ другимъ промывательнымъ изъ молока, варенаго съ чеснокомъ.

Наружныя болѣзни.

Воспаленіе.

55. ЧИСТО-НАРУЖНОЕ ВОСПАЛЕНІЕ обнаруживается болью, краснотой, усиливающимся жаромъ и опухолью. Смотря по степени воспаленія, бываетъ болѣе или менѣе лихорадка.

Сначала должно стараться устранить причину болѣзни. Если это невозможно и воспаление продолжается, то стараться разбить его. Поставить 6—15 пиявокъ одинъ или нѣсколько разъ къ больному мѣсту, и потомъ дѣлать примочки холодною водою съ уксусомъ или однимъ простымъ виномъ. Въ случаѣ сильной лихорадки, см. (II—9) или (II—10). Діета № 1-й.

56. **НАГНОЕНІЕ** дѣлается тогда, когда воспаление не будетъ разбито. Опухоль сначала бываетъ очень велика, съ болью и напряженностью, потомъ становится меньше и блѣднѣе и посрединѣ поднимается вверхъ. Въ опухоли дѣлается біеніе, и больной чувствуетъ въ ней нѣкоторую тяжесть. Напослѣдокъ середина становится тонкою и желтою, прорывается, и изъ нея вытекаетъ гной.

Разбивающія средства (II—55) должно оставить и употреблять теплыя припарки. Ночью, когда нельзя перемѣнять ихъ какъ слѣдуетъ, прикладывать къ больному мѣсту вытяжной пластырь.

Когда матерія станетъ выходить, то продолжать тѣ же самыя средства до тѣхъ поръ, пока гноеніе очень сильно. Давать больному мѣсту, если можно, такое положеніе, чтобы матерія свободно могла вытекать, и держать его въ чистотѣ, не прикасаясь однако же—какъ это часто случается—до самой поверхности нарыва.

Нарывъ мало по малу уменьшается и изъ него выходитъ немного матеріи. Тогда оставить всё средства и прикладывать къ нарыву одной корпии.

37. АНТОНОВЪ ОГОНЬ бываетъ послѣ самаго сильнаго воспаленія. Больное мѣсто сжимается (сухой антоновъ огонь) или оно становится больше, дѣлаются пузырьки, которые прорываются и изъ нихъ вытекаетъ жидкая зловонная матерія (мокрый антоновъ огонь). Въ обоихъ случаяхъ чувствительность и теплота исчезаютъ въ больномъ мѣстѣ. Если больной не умираетъ, то по краямъ помертвѣлой части само собою образуется красное углубленіе: это значить, что сама природа старается удалить помертвѣлую часть.

Наружное леченіе состоитъ въ примочкахъ тепловатою ромашкою. Если вытекаетъ очень много зловоннаго гноя, то посыпаютъ нарывъ, нѣсколько разъ въ день, угольнымъ порошкомъ, но такъ, чтобы прежній уголь, передъ посыпкою свѣжимъ, смывался, всего лучше шприцованіемъ ромашкою. Когда пораженная антоновымъ огнемъ часть тѣла совершенно отдѣлится, то къ свѣжему нарыву прикладываютъ деревянное масло или спускъ.

Внутреннее леченіе весьма различно. Молодымъ людямъ, у которыхъ антоновъ огонь происходитъ отъ сильнаго воспаленія, или отъ ушиба, давать (III—4) при діетѣ № 1-й.

Но антоновъ огонь бываетъ обыкновенно у старыхъ или у слабыхъ людей. Въ такомъ случаѣ употреблять хорошую мясную пищу, яица, молоко и рюмку травнику.

38. РАКЪ образуется послѣ продолжительнаго воспаленія обыкновенно на тѣхъ частяхъ, которыя часто раздражаются, по большой части, на губахъ. Это нечистый зловонный нарывъ, окруженный затвердѣнiемъ. Сначала можно попробовать припарки вареною морковью. Если это не поможетъ, то не терять времени и отправить больного для сдѣланія операціи.

О ракѣ на грудяхъ см. (II—36, г.)

Нѣкоторыя части тѣла въ особенности подвержены воспаленію.

39. ВОСПАЛЕНІЕ ПАЛЬЦЕВЪ обыкновенно не опасно. Употреблять теплыя припарки, а на ночь гуммозный пластырь.

Однако иногда краснѣеть и пухнетъ не только вся кисть, но и нижняя часть руки. Въ такомъ случаѣ немедленно послать больного къ врачу: иначе могутъ быть самыя опасныя послѣдствія.

Иногда образуется нечистый нарывъ съ зловоннымъ гноемъ и вовсе не заживаетъ. Это костоѣда, и больной также долженъ немедленно обратиться къ врачу.

Часто ноготь на большомъ пальцѣ ноги вросаетъ

въ тѣло, производитъ гноеніе и совсѣмъ не даетъ ходить. Въ такомъ случаѣ надо взять тонкую свинцовую дощечку и стараться спереди впустить ее подъ край вросшаго въ тѣло ногтя гдѣ больно, и оставить ее тамъ, по временамъ подвигая назадъ. Если это не удастся, то обратиться къ врачу.

60. ВОСПАЛЕНІЕ ЖЕЛЕЗЪ. Железы въ паху, въ подмышкѣ, или подъ нижнею челюстью, часто воспаляются. Сначала поставить пѣвокъ; потомъ натирать политанью три раза въ день.

При воспаленіи яицъ поставить пѣвокъ къ паху и сверхъ того подвязать яица. Больнаго подпоясываютъ платкомъ по поясницѣ; къ этому платку прикрѣпляютъ спереди другой, который спускаютъ внизъ прямо на яица, поднимаютъ сзади вверхъ и прикрѣпляютъ къ первому платку на самой поясницѣ. Отъ этого больное яицо поднимается вверхъ. Натирать его политанью.

61. ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗЪ. часто дѣлается отъ вѣшнихъ причинъ. Примочки холодною водою. Если же оно происходитъ отъ внутреннихъ причинъ, то поставить 4 пѣвки къ виску больнаго глаза и почаще примачивать тепловатымъ молокомъ. Занавѣшивать глаза лоскутомъ полотна, привязавъ его шнуркомъ къ головѣ, такъ, чтобы лоскутъ свободно спускался на глаза и защищалъ

ихъ отъ свѣта. Избѣгать носить на головѣ что нибудь теплое.

Въ трудныхъ глазныхъ болѣзняхъ обращаться къ врачу.

62. РОЖА есть воспалительная на большомъ пространствѣ краснота кожи, которая, при давленіи пальцемъ, пропадаетъ, но тотчасъ появляется снова. Если она происходитъ сама собою, то всегда сопровождается болѣзнію, описанною въ (II — 9) и требуетъ такого же леченія. Снаружи носить на покраснѣвшемъ мѣстѣ сухую припарку (ароматическую подушку), или употреблять обыкновенное общеизвѣстное средство, красное сукно, посыпанное толченымъ мѣломъ и камфарою. Діета № 1-й.

Особеннаго вниманія требуетъ рожа на лицѣ. Давать рвотнаго не должно, но (III—2), или побольше кремортартару. Сверхъ того ціявки, а въ случаѣ весьма сильной лихорадки, пустить кровь. Рожа на лицѣ очень легко возобновляется, что можетъ имѣть весьма опасныя послѣдствія. По этому больной не долженъ выходить изъ комнаты, пока не исчезнутъ и малѣйшіе слѣды болѣзни.

Если послѣ рожи образуется нарывъ, то прикладывать вытяжной пластырь.

Примѣчаніе. Въ рожѣ не должно употреблять никакихъ влажныхъ и жирныхъ наружныхъ средствъ.

63. ВЕРЕДЪ (ЧИРЕЙ) сначала появляется въ видѣ маленькаго краснаго пятна на кожь, потомъ дѣлается съ большою болью нарывъ, который постепенно увеличивается, синѣеть и напослѣдокъ прорывается; послѣ чего боль вдругъ прекращается. Если вередъ очень великъ, или ихъ дѣсколько, то открывается довольно сильная лихорадка.

Болезнь эта происходитъ отъ тѣхъ-же причинъ, какъ и (II—62) и (II—9), отъ испорченности желудка, и требуетъ такого же точно внутренняго леченія. Наружно употреблять теплыя припарки, а на ночь прикладывать гуммозный пластырь; если-же нарывъ очень великъ, то базильную мазь; въ противномъ случаѣ только спускъ. Діета № 1-й; нѣсколько времени должно также употреблять (III—9).

64. ОБЖОГА огнемъ или жидкими веществами. Всего лучше привязать хлопчатой бумаги къ обожженному мѣсту. Если сея нѣтъ, то дѣлать примочки холодною водою. Но какъ скоро кожа такъ повреждена, что не можетъ выносить холода, тогда прикладывать тряпку, напитанную или однимъ деревяннымъ масломъ, или пополамъ съ известковою водою. Если есть пузыри, то проколоть ихъ иглою, но кожи не снимать. При сильной лихорадкѣ (III—4).

При заживаніи слѣдуетъ наблюдать, чтобы часть

обожженной кожи не была обезображена, или не срослась съ другою частью. По этому надо давать обожженному мѣсту надлежащее положеніе: такъ на примѣръ, при обжогѣ пальцевъ всегда класть между ними тряпки, напитанныя деревяннымъ масломъ.

65. ЗАМЕРЗАНИЕ въ легкой степени (ознобленіе) требуетъ только натиранія свѣгомъ, или льдиною холодною водою. Если останется опухоль, то почае намазывать ее свѣжимъ гусинымъ саломъ. Къ нарыву всего лучше привязывать дигестивной мази (*ungv. digestivum III—13*).

Если ознобленный членъ будетъ слишкомъ скоро отогрѣтъ, то произойдетъ сильная боль съ бісненіемъ и большая опухоль; часть эта покрасится, воспалится и на послѣдокъ можетъ сдѣлаться антоновъ огонь. Тогда тереть свѣгомъ, или самую холодною водою до тѣхъ поръ, пока боль уймется и нарывъ уменьшится. Антоновъ огонь лечить какъ показано выше (II—57).

Очень часто случается, что люди, особливо охмѣлшіе, застигаются мятелюю, и ихъ находятъ замерзшими. Въ такомъ случаѣ поступать слѣдующимъ образомъ: замерзшаго внести въ холодную комнату съ большею осторожностью, потому что мерзлые члены очень легко переламываются, и хорошенко растирать его долгое время свѣгомъ,

или льдисто-холодною водою. Должно растирать какъ только можно долбе, потому что опыты часто показывали, что подобные мнимо-мертвые люди, послѣ растиранія въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, обнаруживали признаки жизни. Какъ скоро тѣло растаетъ, то натереть его простымъ виномъ и хорошенько покрыть, но все еще въ холодной комнатѣ. Потомъ вдуть въ ротъ воздухъ, держать подъ носомъ нашатырный спиртъ, или курить подъ носомъ кожею, и растирать виномъ то мѣсто, гдѣ сердце. Если замерзшій обнаружить тогда признаки жизни, то воздухъ въ комнатѣ мало по малу нагрѣвать и давать пить теплаго чаю, съ прибавленіемъ небольшого количества вина или водки.

Болезни отъ наружнаго насилія.

66. УШИБЪ происходитъ часто отъ удара обо что нибудь, отъ побой, отъ паденія съ высокаго мѣста и т. д. Если будутъ желтыя и синія пятна, то нѣсколько дней примачивать ихъ водою пополамъ съ уксуомъ, или однимъ простымъ виномъ, а еще лучше свинцовою водою. Если больной чувствуетъ послѣ того боль и слабость, то

натирать больное мѣсто каждый день раза два простымъ виномъ, или мыльнымъ спиртомъ. Ежели ушибенный сильно испугался, дыханіе тяжело и руки трясутся, то давать кремортартару съ водою, или (III—4). Смотря по тому, какое мѣсто ушибено, и леченіе бываетъ различное.

а) УШИБЪ ГОЛОВЫ съ пораненіемъ, или безъ пораненія. Ежели ушибъ такъ силенъ, что больной въ безпамятствѣ, или у него головокруженіе съ рвотою, то должно тотчасъ выбрать голову, для того чтобъ можно было поставить піявокъ и дѣлать холодныя примочки. Голову класть выше и наблюдать, чтобы воздухъ въ комнатѣ былъ чистъ. Пока больной блѣденъ въ безпамятствѣ и холоденъ, не должно употреблять дальнѣйшаго леченія. Но если потомъ будетъ жаръ съ закладываніемъ груди и головою болью, то немедленно пустить три чашки крови и (III—4).

б) УШИБЪ ГРУДИ И ЖИВОТА немедленно требуетъ обильнаго кровопусканія, хотя бы больной находился и въ безпамятствѣ. Впрочемъ, поступать, какъ сказано выше (а).

в) При УШИБѢ КОЛѢНА, если притомъ есть опухоль, поставить 10—13 піявокъ и примачивать свинцовою водою. Если боль и жаръ возобновятся, то опять піявокъ. Какъ скоро боль и опухоль пройдутъ, то натирать колѣно, по нѣ-

сколько разъ въ день, оподельдокомъ, или мыль-
нымъ спиртомъ и не ходить до тѣхъ поръ, пока
вовсе не останется боли и колѣно будетъ сво-
бодно сгибаться. Вообще необходимо давать уши-
бенному колѣну совершенный покой. Если опухоль
останется и тогда, какъ давно уже нѣтъ никакой
боли, то поставить двѣ фонтанели на томъ мѣстѣ,
гдѣ опухоль наиболее чувствительна.

Примѣчаніе. Эта болѣзнь, повидимому незначи-
тельная, часто дѣлаетъ колѣками, и потому
никогда не должно пренебрегать ею.

г) УШИБЪ ЯИЦЪ. Лечение такое же, какъ (II—60); только вмѣсто мази свинцовая вода.

Примѣчаніе. При ушибѣ близъ кости всегда должно
ислѣдовать, не переломлена-ли она.

67. РАНЫ — какаѣ бы ни была ихъ причины,
свойство и мѣсто — требуютъ слѣдующаго леченія

а) УДАЛЕНІЕ ПОСТОРОННИХЪ ТѢЛ. Это
въ особенности относится къ ранамъ отъ выстрѣла.
Нечистота, заекшаяся кровь и проч. должны быть
обмыты губкою.

б) Если КРОВОТЕЧЕНІЕ не слишкомъ силь-
но, то цѣлоторое время его не останавливаютъ.
Напослѣдокъ его останавливаютъ холодною водою,
укусомъ, или трутёмъ. Но кровотеченіе часто
бываетъ такъ обильно, что эти средства недоста-

точны, и оно может даже подвергнуть жизнь опасности. Въ такомъ случаѣ должно различать слѣдующія свойства кровотеченія.

аа. Кровь непрерывно и равномерно течетъ изъ раны, черна, и перестаетъ течь, когда придавать пальцемъ ниже раны. Тогда намочить лоскутъ полотна уксусомъ и сложить его во столько разъ, чтобы вышла твердая подушечка, которую наложить на то мѣсто, откуда идетъ кровь. На эту подушечку положить другой компрессъ нѣсколько побольше и напоследокъ компрессъ еще побольше. Эти три компресса хорошенько прикрѣпить бинтомъ, обвязаннымъ вокругъ члена, или платкомъ. Однако эта перевязка должна быть не слишкомъ крѣпка, такъ, чтобы членъ къ низу не дѣлался опухлымъ, или даже синимъ.

бб. Или кровь свѣтло-красная и пѣнящаяся, течетъ не непрерывно, но бьетъ дугою и перестаетъ течь при давленіи пальцемъ выше раны. Это значить, что повреждена пульсовая жила. Испытать вышеописанную перевязку; если же это не поможетъ, то должно употребить турникетъ. При пораненіи руки, привязать турникетъ къ внутренней сторонѣ верхней части руки, между локтемъ и подмышкою, а при пораненіи бедра, или ступни, — къ подколенной. Взять чтонибудь твердое и овальное, на примѣръ: грецкій орѣхъ или пробку,

которой края были бы округлены на подобіе яйца, завернуть въ компрессъ и привязать платкомъ или бинтомъ къ кости выше означенныхъ мѣсть. Но какъ такой турникетъ нельзя долго выдерживать, то поскорѣе обратиться къ врачу.

в) ПЕРВАЯ ПЕРЕВЯЗКА. Какъ скоро рана будетъ очищена и кровотеченіе унято, сдѣлать перевязку. По возможности стараться соединить края раны, однакоже безъ всякаго усилія. Пораненному мѣсту дать такое положеніе, чтобы края раны сошлись; потомъ плотно соединить ихъ липкимъ пластыремъ. Сверхъ пластыря наложить корпію, а на нее компрессъ и, если можно, слегка перевязать бинтомъ. Если не будетъ сильнаго кровотеченія (нѣсколько сукровицы вытекаетъ изъ всякой большой раны и ничего не значитъ), то перевязку эту не трогать лѣтомъ 5, а зимою 4 дня.

г) СНИМАТЬ ПЕРВУЮ ПЕРЕВЯЗКУ слѣдуетъ съ большою осторожностію, для того чтобы не раздвинуть краевъ раны, а главнымъ образомъ, чтобы не произвести кровотеченія. Передъ тѣмъ какъ снимать перевязку, должно размягчить все, положенное на рану, тепловатою водою. Если рана совершенно, или по большой части, зажила, то прикладывать къ ней только корпію. Если же изъ нея выходитъ много гною, то его выдавить и вообще лечить, какъ показано выше (II—36).

д) **ДАЛЬНѢЙШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.** Въ случаѣ сильнаго гноенія, перевязывать каждый день два раза и класть побольше корпѣи. Гной выдавливать и обмывать вокруг раны; но до самой раны не касаться. Если же выходит мало гною, края блѣдны, или даже сухи, то привязать дигестивной, или базильной мази.

е) **ДИКОЕ МЯСО** нарастаетъ тогда, когда гное-нiе очень сильно и продолжительно. Сначала посы-пать его мелко-истолченнымъ сахаромъ; если же это не поможетъ, то квасцовымъ порошкомъ. Во всякомъ случаѣ перевязать бинтомъ, для того чтобъ больше стянуть рану.

ж) **ВНУТРЕННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ** обыкновенно бы-ваетъ ненужнымъ. Если же откроется сильная ли-хорадка отъ раны, а прежде вышло мало крови, то иногда должно пустить кровь. Въ такомъ слу-чаѣ (III—4), или кремортартаръ. Діета № 1-й. Пожилымъ или слабымъ людямъ, у которыхъ рана мало гноится, давать питательную пищу: яйца, молоко и рюмку водки.

68. **УКУШЕНИЕ БЫШЕНОЮ СОБАКОЮ.** Долж-но какъ можно скорѣе употребить сильныя сред-ства. Вѣрнѣйшее состоитъ въ томъ, чтобъ вырѣ-зать всю рану. Но какъ въ деревняхъ рѣдко бы-ваетъ возможнымъ сдѣлать это въ самомъ скоромъ времени, то и стараться поскорѣе произвести силь-

ное воспаление въ ранѣ: сначала хорошенько и долго промывать рану уксусомъ съ водою, потомъ растравлять нашатырнымъ спиртомъ. Еще благодѣяніе и лучше выжечь рану кускомъ трута величиною въ рану и въ 3 долю вершка толщиною, или порохомъ. Гноеніе поддерживать нѣсколько недѣль фонтанельною мазью, а вокругъ раны два раза въ день натирать политанью. Ложкою поднимать два раза въ день языкъ и смотрѣть, нѣтъ ли под нимъ пузырьковъ, которые и выжечь раскаленною проволокою. Берутъ спичку изъ толстой желѣзной проволоки, или иголку; одинъ конецъ обвертываютъ лоскутомъ полотна, чтобы держать за этотъ конецъ, а другой конецъ раскаливаютъ на свѣчѣ. Какъ скоро конецъ раскалится, то прикасаются имъ къ пузырькамъ. Внутри давать крѣпкаго чаю изъ шильной травы (*flores genistae tinctoriae*) по три стакана въ день.

Примѣчаніе. Есть много хорошихъ простонародныхъ средствъ противъ этой болѣзни. Если извѣстенъ другой испытанный способъ леченія, то пусть ему и слѣдуютъ; но только никогда не должно выпускать изъ вида вышепоказанное леченіе самой раны.

По большой части, укушенія собаками безвредны, и не требуютъ никакого особеннаго леченія.

Въ избѣжаніе выше изложеннаго хлопотливаго леченія, должно изслѣдовать, дѣйствительно ли собака взбѣсилась. Больная собака невесела, избѣгаетъ другихъ собакъ, и онѣ ея избѣгаютъ. Она не ѣсть и не пьетъ; потомъ худѣетъ, опускаетъ хвостъ между задними ногами; шерсть на спинѣ поднимается вверхъ, глаза становятся красными и слезятся. На послѣдокъ она не узнаетъ своего хозяина, всѣхъ хочетъ укусить; изо рта выходитъ пѣна; при видѣ воды у нея дѣлаются судороги, и она въ нихъ издыхаетъ. Если есть сомнѣніе насчетъ водобоязни, то всегда благонадежнѣе предполагать худшее.

69. УЖАЛЕНИЕ ПЧЕЛОЮ ИЛИ ОСОЮ. Всего лучше нагирать ужаленное мѣсто свѣжимъ медомъ. Другіе прикладываютъ холодной земли или примачиваютъ холодной водою. Жало тотчасъ должно вынуть.

70. ПЕРЕЛОМЪ КОСТЕЙ требуетъ слѣдующаго леченія.

1. Какъ скоро несчастіе случилось, то должно осторожно перенести больного, всего лучше на носилкахъ, которыя, въ случаѣ нужды, можно сдѣлать изъ двери, снятой съ пробоевъ. Если же надо далеко перевозить его, то въ телѣгѣ, или въ саняхъ, набитыхъ соломою.

2. По прибытіи на мѣсто, осторожнѣе снять платье; если нужно, то разрѣзать сапоги.

3. Немедленно осмотрѣть переломъ. Обыкновенно на немъ дѣлается красная опухоль съ болью. Впрочемъ, переломъ узнается и потому, что членъ измѣняетъ свой видъ, что въ переломленномъ мѣстѣ замѣтно движеніе, когда слегка двигаютъ нижній конецъ той же кости, и что этотъ членъ лишается своего дѣйствія. Но вѣрнѣйшій признакъ состоитъ въ томъ, когда, приводя въ движеніе нижнюю часть кости, можно чувствовать треніе обоихъ концовъ кости другъ объ друга, или, что требуетъ нѣкотораго навыка, когда самъ больной это чувствуетъ.

4. Удостоверившись въ переломѣ, надо стараться привести концы кости въ надлежащее положеніе (сдѣлать правку). Для этого слѣдуетъ хорошенько осмотрѣть такой-же неповрежденный членъ на другой сторонѣ тѣла, чтобы знать, какой видъ должна имѣть правка, какъ скоро она сдѣлана удачно. Одинъ держитъ выше перелома обѣими руками, тогда какъ другой правою рукою ниже перелома вытягиваетъ членъ, для того чтобы отдалить оба конца переломленной кости одинъ отъ другаго, и лѣвою рукою привести части перелома въ надлежащее положеніе. Когда больной вдругъ перестанетъ чувствовать внутреннюю боль, это значитъ, что правка совершенно удалась. Но какъ скоро больной чувствуетъ эту внутреннюю боль,

или въ переломѣ остается какое-то неприятное ощущение, это значитъ, что правка неудачна, и ее должно продолжать до тѣхъ поръ, пока все придетъ въ порядокъ, потому что въ этомъ, главнымъ образомъ, состоитъ все лечение.

Примѣчаніе. Нерѣдко случается, что концы кости, при переломѣ, не расходятся, и больной не чувствуетъ никакой внутренней боли; да и самый членъ не потерялъ надлежащаго вида. Въ такомъ случаѣ, само собою разумѣется, правка не нужна.

5. Послѣ правки концы кости должны быть удержаны въ надлежащемъ положеніи, что и дѣлается посредствомъ перевязокъ. Объ этомъ подробнѣе въ описаніи переломовъ разнаго рода.

6. Очень часто, даже обыкновенно, бываетъ снаружи опухоль съ болью и мѣшаетъ надлежащей перевязкѣ. Тогда поставить пиявокъ и примачивать холодною водою съ уксусомъ, или простымъ виномъ, такъ же свинцовою водою, какъ сказано выше (II—66). Переломленный членъ положить на подушку такъ, какъ больной найдетъ для себя лучшимъ, и держать въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока, чрезъ нѣсколько дней, боль и самая опухоль уменьшатся. Тогда можно будетъ сдѣлать хорошенько перевязку.

7. Внутреннее лечение рѣдко бываетъ нужнымъ. Въ такомъ случаѣ (II—66).

Примѣчаніе. Если концы кости раздроблены и прошли сквозь кожу, то больного немедленно отправить въ больницу. Если при томъ сильное кровотеченіе, то см. (II—67, б).

Всего чаще случаются слѣдующіе переломы:

а) **ПЕРЕЛОМЪ КЛЮЧИЦЫ** рѣже бываетъ отъ удара прямо по самой ключицѣ, нежели отъ удара по плечу, или отъ паденія, при которомъ больной протянувъ руку, хотѣлъ удержаться. Болѣзнь эту легко узнать. Движеніе рукою трудно, хотя и безъ большой боли, а именно: больной не можетъ поднять руку къ головѣ. Плечо становится ниже, опускаясь къ боку. Дѣлается боль въ переломленномъ мѣстѣ, гдѣ явственно можно чувствовать, какъ разошлись концы кости и какъ они снова соединяются, когда даютъ плечу его естественное положеніе.

Правка дѣлается такъ: берутъ за плечо и двигаютъ его вверхъ и назадъ, пока концы перелома хорошенько сойдутся. Въ этомъ положеніи дѣлають перевязку. Сперва кладутъ въ подмышку нѣсколько разъ сложенную салфетку или полотенце, потомъ верхнюю часть руки довольно крѣпко привязываютъ къ грудному боку. Для этого берутъ салфетку или полотенце, складываютъ широко, кладутъ срединею на верхнюю часть руки и сшиваютъ оба конца на противоположномъ грудномъ

боку. Нижнюю часть руки посят на обыкновенной повязкѣ (шарфъ). Складываютъ салфетку въ три угла; два длинные угла завязываютъ на шею, а третій уголь прикрѣпляется къ локтю. Перевязку сначала почаше натягиваютъ, для того чтобъ она крѣпко приходилась, но не давила. Чрезъ 4—6 недель переломъ вылечивается. Больной можетъ ходить съ осторожностью.

Часто, особливо когда ударъ пришелся прямо на самую ключицу, дѣлается стѣсненіе груди и кровохарканье. Въ такомъ случаѣ тотчасъ пустить кровь и лечение (II—66 б).

б) ПЕРЕЛОМЪ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКИ (отъ плеча до локтя). Правка рѣдко бываетъ нужна, потому что части перелома почти всегда остаются въ соприкосновеніи одна съ другою. Когда опухоль опадетъ (II—70, б), то дѣлаютъ слѣдующую перевязку. Вырѣзываютъ 4 лубка изъ толстаго картона такой длины, чтобъ они доставали отъ подмышки до локтя, и такой ширины, чтобъ не находили одинъ на другой. Ихъ размачиваютъ въ водѣ, отъ чего они и приходятся точь-вточь по члену; потомъ каждый изъ нихъ обвертываютъ лоскутомъ полотна и прикладываютъ къ рукѣ. Для того чтобъ они плотно держались, обвязываютъ ихъ полотнянымъ бинтомъ въ три пальца шириною какъ можно крѣпче, однако же такъ,

чтобы больной не чувствовал боли и что бы нижняя часть руки не опухала. Нижнюю часть руки согнуть и держать на повязку (шарф) (II—70 а). Больной может ходить. Въ 4—6 недель переломъ обыкновенно вылечивается. Ночью класть руку на особую подушку.

в) **ПЕРЕЛОМЪ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУКИ** (отъ локтя до кисти). Правка иногда бываетъ не совсемъ легка и всегда дѣлается (II—70, 4) при полусогнутомъ локтѣ. Впрочемъ поступать такъ, какъ показано подъ лит. б (II—70), съ тою только разницею, что если передняя часть руки не толста, то брать два лубка, которые класть на внутреннюю и наружную стороны нижней части руки такъ, чтобы они покрывали всю эту часть кости. Длина лубковъ отъ локтя до кисти.

г) **ПЕРЕЛОМЪ РЕБРЪ**, при неопытности, почти нельзя узнать, что впрочемъ и неважно, потому что не нужно ни правки, ни перевязки. Причиною всегда бываетъ наружное насиліе на то мѣсто, гдѣ случился переломъ, напримѣръ, ударъ ногою лошади, и больной чувствуетъ постоянную колючую боль, когда глубоко вздохнетъ.

Всегда нужно бываетъ пустить кровь одинъ или нѣсколько разъ, пока дыханіе сдѣлается свободнымъ, потомъ (III—4); вообще леченіе (III—66 б). Больной долженъ оставаться въ по-

койномъ положеніи; впрочемъ, можетъ понемногу и ходить; только не носить тѣснаго платья.

д) ПЕРЕЛОМЪ БЕДРЕННОЙ КОСТИ трудно узнать постороннему; всего же легче самому больному, который чувствуетъ треніе концовъ кости во время движенія. Правка нужна тогда только, когда больное бедро короче другаго; не нужно также никакой другой перевязки, кромѣ широкаго бинта, обвитаго отъ паха до колѣна. Но положеніе бедра требуетъ особеннаго вниманія. Больной долженъ лежать на спинѣ и класть переломленное бедро на матрацъ, состоящій изъ мѣшка, мягко, но плотно набитаго мхомъ, или рубленою соломою. Этотъ матрацъ долженъ быть длиною отъ бедра до пятки; на немъ, отъ тяжести бедра, образуется желобъ, въ которомъ бедру спокойно лежать. Посрединѣ кладутъ поперекъ подъ матрацъ полено, для того чтобъ колѣно было нѣсколько приподнято и выгнуто. Если на матрацѣ окажутся впадины, отъ которыхъ будетъ больно или безпокойно, то наполнять ихъ платками; а всего лучше пусть самъ больной скажетъ, какъ покойнѣе ему лежать. Подъ пятку класть немного мягкой коршіи, потому что въ первые дни пятка всегда немного болитъ, а ступню, посредствомъ подушки, держать въ твердомъ положеніи. Больной не долженъ сходить съ постели; а для от-

правленія нужды на низъ подставлять ему плоской тазъ, осторожно приподнимая его самого.

Болезнь продолжается недѣль 3; послѣ того выздоравливающей долженъ нѣкоторое время ходить на костыляхъ.

У старыхъ женщинъ переломъ этотъ нерѣдко случается близь костреца и требуетъ того же самаго леченія.

е) ПЕРЕЛОМЪ БЕРЦЕВОЙ КОСТИ случается всего чаще, и его обыкновенно легко узнать. Правка этого перелома часто бываетъ довольно затруднительна, или концы кости послѣ правки снова расходятся. Правку всегда должно дѣлать, согнувъ колѣно до половины. Впрочемъ (II—70, 4).

Положеніе, какое должно давать ногѣ, описано выше (II—70 д). Но притомъ должно брать три лубка (II—70 б), одинъ пошире подъ икру и два поуже по бокамъ. Длина лубковъ отъ колѣна до ступни и книзу уже, нежели кверху, для того чтобъ не находили одинъ на другой. Пятка должна находиться на чемъ нибудь мягкомъ и нѣскольکو ниже, во впадинѣ. Ступню, посредствомъ подушки, держать въ стоячемъ положеніи. Впрочемъ (II—70 д).

Черезъ 4—6 недѣль больной можетъ начать ходить на костыляхъ. Происходящую при этомъ опухоль въ ногахъ натирать простымъ виномъ или

камфарнымъ спиртомъ; да она мало-по-малу проходитъ и сама собою.

71. **ВЫВИХЪ** въ особенности случается въ верхней части руки. Напрасно было бы описывать въ этой книгѣ, какимъ образомъ вправляется вывихъ. Если по близости нѣтъ челоуѣка, который бы умѣлъ это сдѣлать, то поскорѣе послать больнаго къ врачу. При сильной боли поставить шпалокъ и дѣлать примочки холодною водою; впоследствии, когда боль почти пройдетъ, но больной еще не свободно будетъ дѣйствовать рукою и останется слабость, натирать камфарнымъ спиртомъ или оподельдокомъ.

72. **ГРЫЖА, КИЛА.** Должно различать недавно случившуюся грыжу отъ застарѣлой.

а) Первая обыкновенно происходитъ отъ поднятія большихъ тяжестей. Грыжу должно вправить и придерживать бандажемъ. Часто случается, что грыжа вдругъ опять выходитъ и уже не можетъ быть вправлена. Боль очень сильна, также и лихорадка. Запоръ, икота и напоследокъ даже рвота каломъ. Опасность очень велика, и все зависитъ отъ того, чтобы грыжа опять была вправлена. Тотчасъ поставить обыкновенное промывательное, а когда оно выдетъ, то промывательное изъ табаку, смотря по его крѣпости, 1—2 чайныя ложки табаку на стаканъ воды. Потомъ посадить больнаго

въ ванну, и когда онъ начнетъ чувствовать слабость, то нерѣдко самъ можетъ вправить грыжу. Если же это не поможетъ, то оставаться въ ваннѣ почти до обморока; потомъ положить больного въ постель на спину и подложить ему подушку подъ самую заднюю часть, для того чтобъ хорошенько приподнять эту часть, и въ этомъ положеніи стараться вправить ему грыжу. Если же и тогда вправка не удастся, то единственнымъ средствомъ остается операція. Внутрь давать (III—4), но безъ врача не давать слабительнаго. При полнокровіи и сильной лихорадкѣ пустить кровь.

б) При застарѣлой большой грыжѣ, которая никогда не можетъ быть вправлена, часто дѣлаются тѣ же самые припадки, но постепенно. Обыкновенно грыжа бываетъ тверда наощупъ, потому что въ ней накапливается много твердыхъ испражнений. Тогда давать (III—15) съ клещевиннымъ масломъ вмѣсто деревяннаго и почаще ставить промывательное. Къ самой грыжѣ поставить пѣвокъ и дѣлать теплыя припарки, натирая политанью. Если боль позволить, то слегка тереть и подавливать грыжу рукою, для того чтобъ размягчить твердые испражнения и мало по малу вдавить ихъ внутрь.

73. ВЫПАДЕНІЕ ПРОХОДНОЙ КИШКИ. Если выходящая наружу кишка не войдетъ внутрь сама

собою, то осторожно вправить ее пальцами, намоченными деревяннымъ масломъ. Ставить клистиры изъ самой холодной воды, или изъ крѣпикаго отвара дубовой коры. Посредствомъ достаточнаго движенія и удобоваримой пищи стараться, чтобы свободно было нанизъ. Если это не поможетъ, то сдѣлать операцію.

У дѣтей или у молодыхъ людей болѣзнь эта весьма обыкновенна. Обмывать задній проходъ краснымъ виномъ, или холодною водою, и обождать, чтобы болѣзнь прошла сама собою.

74. ВНЕЗАПНАЯ БОЛЬ ВЪ ПОЯСНИЦѢ нерѣдко случается у людей сильныхъ, мускулезныхъ, отъ поднятія большихъ тяжестей, или отъ быстрого движенія. Чрезвычайно сильная боль эта не даетъ дѣлать никакого движенія. При томъ бываетъ большой испугъ, потому что больной думаетъ, что у него сдѣлалось весьма опасное поврежденіе.

Обыкновенное простонародное средство состоитъ въ томъ, что больной ложится въ постель на брюхо, а старуха топчетъ ногами по крестцу. Отъ этого боль часто проходитъ такъ же скоро, какъ она и пришла. Кто желаетъ подвергнуться такому леченію, тотъ пусть испытаетъ его. Впрочемъ, болѣзнь эта не такъ опасна, какъ она ка-

жется. Каждый день садиться въ ванну, къ поясицѣ поставить испанскую мушку, потомъ привязать фонтанельной мази и взять 1—2 недѣли терпѣнія.

Я з в ы.

75. СВѢЖІЯ ЯЗВЫ, особливо отъ наружнаго насилія, у здоровыхъ людей требуютъ только чистоты и предохраненія отъ наружнаго воздуха. Каждый день перевязывать, держать въ чистотѣ мѣста вокругъ язвы, но къ самой язвѣ не прикасаться. Если она свѣжа и нераздражitelъна, то прикладывать спускъ; къ язвамъ же, которыя не такъ уже свѣжи и при томъ безъ боли—базильную или дигестивную мазь.

76. ЗАСТАРѢЛЫЯ ЯЗВЫ бывають обыкновенно на берцѣ; происходятъ, по большей части, отъ внутренней болѣзни и поддерживаются ею; поэтому онѣ вылечиваются только внутренними лекарствами, или проходятъ отъ времени сами собою. А какъ причину внутренней болѣзни трудно узнать, то и отправить больнаго къ врачу. Наружное лечение (II—75).

Примѣчаніе 1. У старыхъ, или у нездоровыхъ людей застарѣлыя язвы служатъ фонтанелью,

и не должно ихъ вымечивать, но только держать въ чистотѣ и предохранять отъ наружнаго воздуха. Если такая язва засохнетъ, то привязать къ ней фонтанельной мази. Если же и тогда не будетъ въ ней нагноенія, то больной, какъ обыкновенно случается, умираетъ отъ апоплексическаго удара, или отъ водяной.

Примѣчаніе 2. Свищи могутъ быть вымечиваемы только врачами, преимущественно въ больницахъ.

77. ЯЗВЫ ОТЪ КОСТОУДЫ узнаются потому, что по близости находится кость; что края язвы круто обозначены и гной зловонный. Если нагноеніе обильно, то каждый день шприцевать чаемъ изъ ромашки, привязывать спуску и все предоставить времени.

78. ПРОЛЕЖНИ дѣлаются у слабыхъ людей отъ продолжительнаго лежанія, по большей части на крестцѣ или на бедрѣ. Какъ скоро на этихъ мѣстахъ покажутся красныя пятна съ болью, то дѣлаютъ примочки холодною водою съ виномъ, или еще лучше свинцовою водою. Изъ мягкаго полотнянаго платка дѣлаютъ вѣнокъ, на которомъ больной долженъ лежать такъ, чтобы пролежни приходились посрединѣ вѣнка. Если же кожа совсемъ сошла, то привязать спуску.

Постороннія тѣла.

79. **ЗАНОЗЫ** деревянныя, металлическія, стеклянныя и проч. въ рукѣ, немедленно должны быть изъ нея вынуты. Если же онѣ ушли подъ толстую кожу, то не всегда можно ихъ вынуть. Тогда перочиннымъ ножомъ или иголкою дѣлаютъ надъ занозою маленькое отверстіе въ кожѣ, прикладываютъ теплыя припарки и даютъ больной части такое положеніе, чтобъ рана обращена была книзу. Въ скоромъ времени постороннее тѣло выходитъ вмѣстѣ съ гноемъ.

80. **ПОСТОРОННІЯ ТѢЛА ВЪ ЗѢВѢ** (глоткѣ) иногда производятъ задушеніе. Обыкновенно это бываютъ кости или твердыя части мяса. Больному стать на колѣна и опереться локтями объ полъ; другому человѣку ударять его по спинѣ между лопатками, и пусть больной самъ старается, посредствомъ кашлянія и напряженія, освободиться отъ посторонняго тѣла. Если это не удастся, то обратиться къ врачу.

81. **ВЪ ЖЕЛУДКѢ.** Небольшія остроконечныя тѣла, наприм. булавки, битыя стекла и проч. обыкновенно проходятъ горломъ и попадаютъ въ желудокъ. Есть побольше каши съ постнымъ или коровьимъ масломъ, также пить яичныя бѣлки; отъ чего эти тѣла почти всегда непримѣтно выходятъ при испражненіи.

82. ВЪ ГЛАЗУ. Должно осмотрѣть не только глазъ, но и внутреннія стороны вѣкъ. Выкупать хорошенько глазъ холодною водою, причѣмъ почаще сморкаться; если же это не поможетъ, то попытаться вынуть постороннее тѣло кончикомъ носоваго платка, или тонкою кисточкою. Но какъ скоро въ глазъ попадетъ извести или золы, то остерегаться воды, а пустить въ глазъ деревяннаго масла. Большія же поврежденія должны быть осмотрѣны врачомъ.

83. МЪШЕЧНАЯ ОПУХОЛЬ состоитъ изъ маленькихъ, круглыхъ или овальныхъ тѣлъ, находящихся подъ кожею, безъ боли, и легко передвижающихся. Однако же они мало по малу вырастаютъ и достигаютъ иногда чрезвычайной величины. Напослѣдокъ они перестаютъ быть подвижными, кожа краснѣетъ, растрескивается, и образуется упорный, часто опасный нарывъ. Конечно, это не всегда случается; но своею величиною они могутъ причинить вредъ другимъ образомъ, или произвести уродливость. Единственное средство операція, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

84. ПЛОЩИЦЫ заводятся отъ неопытности на дѣтородныхъ частяхъ, или въ рѣсницахъ. Ихъ легко истребить: стоитъ только въ банѣ намазать тѣ мѣста, гдѣ онѣ водятся, политанью, и чрезъ часъ обмыть мыльною водою.

Отравы и внезапныя опасности жизни.

Общія правила. Если кто нибудь съѣлъ или выпилъ что нибудь ядовитое, но не знаетъ еще, что это такое, тотъ долженъ наблюдать слѣдующія правила:

1. Если есть рвота, то содѣйствовать усиліямъ природы удалить все вредное; для этого надо принять рвотное (III—5).

2. Если нѣтъ рвоты, или когда она прекратится, то стараться, какъ только можно больше, заглушить вредное и чрезъ то сдѣлать его безвреднымъ. Для этого стараться, какъ только можно больше, пить, особливо молока, яичныхъ бѣлковъ съ водою, или варенаго въ водѣ льнянаго сѣмени.

3. Вскорѣ потомъ принять слабительное, напримеръ: 5 золотниковъ англійской, или глауберовой соли. Если же боль очень сильна, то поставить промывательное.

4. Наконецъ обратить вниманіе на мѣстную боль, происходящую отъ яда, которая всегда бываетъ воспалительнаго свойства, слѣдовательно опасна. Поставить піявокъ къ тому мѣсту, гдѣ боль, прикладывать теплыя припарки; а при полнокровіи и сильной лихорадкѣ, пустить кровь.

Если же известно, какой был употребленъ ядъ, то смотрѣть объ этомъ особыя наставленія, изложенныя въ статьяхъ о различныхъ ядахъ.

35. МЫШЬЯКЪ есть самая обыкновенная отравя, частію отъ злонамѣренности, частію отъ неосторожности, когда дѣти принимаютъ за сахаръ порошокъ для истребленія крысъ, или съѣдаютъ лепешки, которыя покупаютъ въ лавкахъ для истребленія таракановъ.

Давать пока молока съ сахаромъ столько, сколько больной выпить можетъ, или яичныхъ бѣлковъ въ холодной водѣ. При этомъ хорошо, если будетъ рвота. При сильной боли въ животѣ поставить пиявокъ и прикладывать теплыя припарки. Промывательныя изъ деревяннаго масла.

Тотчасъ обратиться къ врачу, потому что въ наукѣ извѣстны вѣрныя противоядія, если только не слишкомъ поздно подать помощь.

36. СУЛЕМА простонародными лекарями нерѣдко дается больнымъ въ большихъ приѣмахъ, и можетъ причинить отравленіе.

Каждыя 5 минутъ по стакану тепловатой воды съ яичными бѣлками: 3 частей воды на 1 часть яичныхъ бѣлковъ. Если будетъ рвота, то тѣмъ лучше. Прочее леченіе такое же, какъ и (II—35).

37. ВЕНЕЦІАНСКАЯ ЯРЬ образуется по большей части отъ дурно вылуженной мѣдной посуды,

или отъ бѣдственнаго обычая класть мѣдную монету въ зеленыя щи, для того чтобы придать имъ красивый цвѣтъ.

Леченіе такое же, какъ и (II—86).

38. **ЛАНИСЬ** рѣдко служитъ отравою, развѣ только при выжиганіи дурныхъ нарывовъ во рту, когда онъ печально выпадетъ изъ руки.

Столовую ложку поваренной соли на стаканъ воды, и эту порцію выпить нѣсколько разъ. Противъ сильной боли въ животѣ см. (II—85).

39. **КИСЛОТЫ**, по вкусу своему, не могутъ быть употребляемы, развѣ только для самоубійства.

Жженная магнезія въ большомъ количествѣ холодной воды. Если ея нѣтъ, то четверть фунта золы на полведра воды, и пить стаканами; можно пить и мыльную воду. Наружное леченіе такое же, какъ и (II—85).

Примѣчаніе. О медленныхъ металлическихъ отравленіяхъ см. (II—27)

90. **ОПУМЪ** становится отравою, когда по ошибкѣ примутъ слишкомъ много капель.

Давать рвотное, и когда подѣйствуетъ, то пить почаще крѣпкій кофе съ лимоннымъ сокомъ или горчицею. Холодныя припарки къ головѣ и теплыя къ ногамъ. Промывательное.

91. **БЪЛЕНА** растетъ повсюду по дорогѣ, или въ садахъ. Иногда дѣти ѣдятъ ее, или простона-

родные лекаря употребляютъ какъ лекарство. Поступать по (II—90).

92. ГРИБЫ требуютъ, какъ можно скорѣе, рвотнаго и потомъ слабительнаго, особливо клещевинаго масла. Ставить промывательныя и пить побольше холодной воды. Если останется нервическое расслабленіе и дрожаніе, то пить крѣпкій кофеи.

93. ИСПАНСКАЯ МУХА простонародными лекарями дается иногда слишкомъ въ большихъ приѣмахъ. Отъ этого дѣлается жженіе въ зѣвъ и въ желудкѣ и особливо въ мочевомъ пузырьѣ съ большимъ трудомъ выпускать урину. Тотчасъ дать рвотнаго; потомъ побольше пить, особливо отвару изъ льнянаго сѣмени, или одного молока. Ставить такія же точно и промывательныя. Въ аптекѣ взять камфарной эмульсіи, и давать по столовой ложкѣ каждый часъ. Эту эмульсію можно составить и дома изъ 15 грановъ (3-й доли золотника) камфары, распущенной въ чайной ложкѣ простаго вина, изъ сыраго яичнаго желтка и 1 стакана воды. Наружное леченіе по (II—83).

Даже отъ наружнаго употребленія испанской мухи дѣлается иногда задержаніе мочи съ болью. Въ такомъ случаѣ давать только камфарной эмульсіи.

94. СОЛЕНАЯ РЫБА часто служитъ самую опасною отравою. Обыкновенно это происходитъ

отъ того, что ѣдятъ ее сырую, что всегда опасно; но нерѣдко и самое соление дѣлается очень дурно; есть даже примѣры, что въ рыбу клали мышьяку, для того чтобъ вѣрнѣе предохранить ее отъ порчи.

На всякій случай, должно вылить воду, въ которой варилась рыба; да и самую рыбу, передъ тѣмъ какъ варить ее, вымыть въ холодной водѣ и въ щелоку, и нарѣзать довольно тонкими кусками. Равнымъ образомъ не должно покупать рыбы, подернувшейся плѣсенью, или попортившейся.

Черезъ 4—12 часовъ послѣ употребленія вредной соленой рыбы дѣлается тошнота, жажда, судороги и раздутіе живота. При томъ запоръ, задержканіе урины и сильная лихорадка съ холоднымъ потомъ.

Тотчасъ рвотное; потомъ слабительное изъ клещевиннаго масла, или (III—2) за одинъ разъ. Промывательныя. Какъ противоядія, жженая магнезія; или золы съ водою (II—89). Наружное леченіе по (II—85). Строго запрещается пить вино.

95. УТОПЛЕНИКИ. Кладутъ утонувшаго на правый бокъ такъ, чтобы голова немного наклонялась внизъ; давятъ брюхо обѣими руками, но не слиш-

комъ сильно, такъ, чтобы выходила вода; потомъ вычищаютъ ротъ и зѣвъ бородкою пера; послѣ того раздѣваютъ и натираютъ грудь и спину простымъ виномъ. Въ тоже время вдыхаютъ въ ротъ воздухъ и держать подъ носомъ нашатырный спиртъ. Если человекъ очень полнокровенъ и лицо у него посинѣло, то можно пустить и кровь, однако не больше 1—2 чашекъ. Положить утопленника въ умеренно-теплую комнату, или лѣтомъ на открытый воздухъ, на солнцѣ. Если же онъ найденъ въ льдисто-холодной водѣ, то сверхъ того поступать по (II—63).

Средства къ оживленію всегда должно употреблять долгое время, часовъ шесть. Первый признакъ возвращающейся жизни—слабое подергиваніе губъ и биеніе сердца. Тогда давать пить чаю съ прибавленіемъ небольшого количества вина или водки.

96. УДАВЛЕНИКИ. У простолюдиновъ существуетъ странное предубѣжденіе, что удавленника не слѣдуетъ снимать съ веревки, пока не будетъ увѣдомлена о томъ мѣстная полиція, отъ чего, естественнымъ образомъ, утрачивается время для попытокъ къ оживленію. Напротивъ, должно тотчасъ употребить всѣ средства къ оживленію и въ тоже время увѣдомить полицію. Сперва снять удавленника съ веревки и положить его головою грудью повыше, такъ, чтобы свѣжій воздухъ

имѣль къ нему свободный доступъ. Потомъ тотчасъ пустить кровь, немного за одинъ разъ, но лучше почаще, по одной чашкѣ. Лечение такое же какъ и выше показанное (II—95).

Объ обжогахъ см. (II—64); о замерзаніи см. (II—65).

97. УГАРЬ рѣдко требуетъ другихъ пособій, кромѣ свѣжаго воздуха, натиранія висковъ уксу-сомъ и нюханія уксуса. Однако же иногда случается мнимое омертвѣніе. Въ такомъ случаѣ поступать по (II—96).

98. УБИТОМУ ГРОМОМЪ пускаютъ кровь, если возможно; потомъ кладутъ его въ яму, на свѣжую землю, и зарываютъ тѣло на поларшина землю, оставляя лицо свободнымъ.

99. СМЕРТЬ—не смотря на всѣ мѣры противъ нея — напоследокъ однако же случается. Кромѣ гніенія, нѣтъ другихъ вѣрныхъ признаковъ смерти. И такъ, если человекъ умеръ скоропостижно, или при особенныхъ обстоятельствахъ, то не должно хоронить его прежде, нежели обнаружится гніеніе. Оно всегда начинается изъ зелена-синимъ цвѣтомъ брюха и зловоніемъ.

III. ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКІЯ ПОСОБІЯ.

1. **НАШАТЫРНАЯ МИКСТУРА.** 1 чайную ложку вѣрхомъ или 1 золотникъ толченаго нашатыря на $\frac{2}{3}$ стакана воды и 1 столовую ложку меду, или немного сахару.—По столовой ложкѣ каждый часъ.

2. **МИКСТУРА ИЗЪ АНГЛІЙСКОЙ СОЛИ, ИЛИ ГЛАУБЕРОВОЙ СОЛИ.** Столовую ложку вѣрхомъ или 5 золотниковъ соли на 1 стаканъ воды: прибавить чего нибудь сладкаго. По 2 столовыя ложки каждый часъ. или—если хотять, чтобъ слабительное подействовало поскорѣе—всю порцію за одинъ разъ.

3. **ЛЕТУЧАЯ МАЗЬ.** 1 часть нашатырнаго спирта на 3 части деревяннаго масла. Если прибавить 6-ю часть камфары, то еще лучше будетъ дѣйствовать.

4. **СЕДИТРЕНАЯ МИКСТУРА.** Такъ же, какъ и (III—1); только вмѣсто нашатыря взять селитры.

Примѣчаніе. Эта микстура почти такая же, какъ и (III—1), съ тою только разницею, что она дается въ сильвѣйшей лихорадкѣ;

напротивъ (Ш—1) употребляется при нечистомъ языкѣ и ослизненіи. Впрочемъ, почти все равно, которую бы изъ нихъ ни давали.

5. РВОТНОЕ. Настоящее рвотное выписывается изъ аптеки. Какъ домашнее рвотное, можно очень хорошо употреблять теплую воду, или чай изъ ромашки, просто, или съ постнымъ или коровинымъ масломъ, и побольше выпить этого рвотнаго поутру натощахъ. Рвотъ содѣйствуютъ щекотаньемъ зѣва (глотки) посредствомъ пальца, или пера.

Можно также употреблять и бѣлый купоросъ (*Zincum sulphuricum*): 1 чайную ложку вровень съ краями на стаканъ теплой воды, и принимать по 1 столовой ложкѣ (дѣтямъ по 1 чайной ложкѣ) чрезъ четверть часа.

Если вырветъ одинъ разъ, то этого недостаточно: должно принимать лекарство до тѣхъ поръ, когда не будетъ уже рвать горькою желто-зеленою желчью.

Не давать рвотнаго беременнымъ женщинамъ, также во время мѣсячнаго очищенія и во время кормленія ребенка грудью. Не давать его и людямъ, одержимымъ грыжею. Если сильная боль подъ ложкой, то рвотное должно быть прописано только врачомъ.

Напротивъ, маленькія дѣти, даже моложе года, очень хорошо выносятъ рвотное

6. **КРЕМОРТАРТАРЪ**—по 1 чайной ложкѣ на стаканъ воды, если угодно, съ сахаромъ—составляетъ пріятное питье въ лихорадкѣ, и эту порцію можно выпивать за одинъ разъ, какъ и (III—2). Онъ въ особенности полезенъ въ лихорадкахъ при горячемъ тѣлѣ, при волненіи крови отъ сильнаго сторженія, и при нечистомъ языкѣ.

7. **СЫВОРОТКА** готовится различными способами—обыкновенно же посредствомъ квасцовъ. Кипятятъ бутылку снятаго молока; когда вскипитъ, то всыпаютъ 2 чайныя ложки толченыхъ квасцовъ, опять немного кипятятъ; потомъ даютъ остыть и процеживаютъ сквозь полотно.

Пьютъ ее чайными чашками, и она въ особенности хороша, какъ дополнительное леченіе, при слабости кровохарканія, рвоты кровью и кровотеченія изъ матки.

Для приготовленія сыворотки посредствомъ кремортартара, берутъ его только 1 чайную ложку. Онъ дѣйствуетъ болѣе какъ слабительное, и въ особенности полезенъ отъ заваловъ и сильнаго ослизенія.

Сыворотку готовятъ и посредствомъ шавеля: его рубятъ и кладутъ 2 горсти.

Сыворотку надо готовить ятъ каждый день, потому что она скоро окисаетъ.

8. **ПОТОГОННЫЙ ЧАЙ** изъ 1 щепоти липо-

ваго цвѣта или сушеной малины на 2 стакана кипятка.

9. КРОВОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ. 4 части александрийскаго листа и 1 часть стеблей сладко-горько. Класть по 1 столовой ложкѣ на 1 стаканъ кипятка. Можно обойтись и безъ стеблей сладко-горько. Пить нѣкоторое время, смотря по комплѣкціи больного, 1—2—3 стакана въ день, такъ, чтобъ слабило понемногу. Въ особенности полезенъ отъ вередовъ и сыпи.

10. МОЧЕГОННЫЙ ЧАЙ. Щепоть толченыхъ можжевеловыхъ ягодъ, или листьевъ петрушки, или корней петрушки на 2 стакана кипятка. Пить тѣмъ больше, тѣмъ лучше.

11. ГРУДНОЙ ЧАЙ, изъ аптеки, хорошо пить теплый съ медомъ отъ простуднаго кашля.

12. УКРОПНЫЙ ЧАЙ. 1 чайную ложку укропныхъ сѣмянъ (*semina foeniculi*) на 1 чайную чашку кипятка. Въ особенности для женщинъ, которыя кормятъ грудью ребенка и у которыхъ мало молока. Хорошо давать этотъ чай и дѣтямъ отъ вѣтровъ, особливо когда испражненія имѣють видъ рубленныхъ яицъ и очень зловонны.

13. МАСЛЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ. 2 столовыя ложки постнаго масла и 1 яичный желтокъ на 1 стаканъ воды. Еще лучше, вмѣсто желтка, 1 столовую ложку арабской камеди (*gummi arabicum*). Жел-

токъ, или арабскую камедь сперва размѣшиваютъ съ постнымъ масломъ; потомъ подливаютъ понемногу воды. Противъ простаго поноса, также кроваваго поноса и боли въ животѣ.

14. РТУТНАЯ ИЛИ НЕАПОЛИТАНСКАЯ МАЗЬ (политанъ) покупается въ аптекъ. Недолжна слишкомъ долго застаиваться.

15. ИСПАНСКАЯ МУХА (шп. мушка). 2 части растопленнаго воска смѣшиваются съ 4 частями деревяннаго масла, и когда смѣсь эта вполнину остынетъ, то мѣшаютъ ее съ 3 частями превращенной въ порошокъ испанской мухи. Или еще проще: сдѣлать твердый спускъ и насыпать въ него побольше порошку изъ испанской мухи. Мухъ этихъ, въ свое время, можно собирать самимъ.

Не смотря на время, испанскую муху не снимаютъ до тѣхъ поръ, пока боль отъ нея сдѣлается слишкомъ сильною. Если пузырь не прорвется самъ собою, то его проколоть иглкою, но кожицы не трогать и привязать спуску.

Не должно прикладывать ее близъ дѣтородныхъ частей.

Если, послѣ испанской мухи, урина будетъ выходить съ болью, то леченіе по (II—95).

16. ФОНТАНЕЛИ ставятся по большей части на рукѣ, всего лучше въ углубленіи, которое находится на внѣшней сторонѣ верхней части руки,

между плечемъ и локтемъ. Прикладываютъ шанскую муху величиною въ полтинникъ, оставляютъ ее сутки и потомъ прорѣзываютъ пузырь, снимая и кожу. Каждый день привязываютъ фонтанельной мази.

Еще проще: перочиннымъ ножичкомъ можно прорѣзать небольшое отверстіе въ вышеупомянутомъ углубленіи на рукѣ, и каждый день класть въ это отверстіе горошину. Никогда не должно заживать фонтанель безъ совѣта врача. Если она высохнетъ сама собою, то перемѣнить мѣсто.

17. ГОРЧИЧНИКИ. Толченую горчицу смочить горячею водою, а не уксусомъ, такъ, чтобъ вышла размазня, тотчасъ намазать на полотняную тряпку и прикладывать пока горчичникъ тепелъ. Не смотря на время, держать горчичники до тѣхъ поръ, когда на кожѣ сдѣлается сильная жгучая краснота, но не долѣе, потому что иначе откроются нечистые нарывы съ болью, которые очень трудно заживаютъ.

Вмѣсто горчицы можно употреблять и хрѣнь.

18. ДИГЕСТИВНАЯ МАЗЬ. Изъ равныхъ частей яичныхъ желтковъ и терпентина. Хороша отъ нарывовъ, которые безъ большой боли и немного гноятся, на примѣръ: отъ нарывовъ послѣ ознобленія.

19. БАЗИЛИКОННАЯ (базильная) мазь отпускается

изъ аптеки, долго сохраняется и употребляется отъ всякихъ нарывовъ.

20. СПУСКЪ: 1 часть воска и 4 части свиного или 3 части деревяннаго масла.

21. ЛИПКІЙ ПЛАСТЫРЬ покупается въ аптекѣ и, когда нужно, намазывается дома. Намазывать его на новую, не слишкомъ тонкую тряпку такимъ слоємъ, чтобы мѣстами можно было видѣть нитки.

22. ГУММОЗНЫЙ или МИЛОТНЫЙ (вытяжной) пластырь, отпускается изъ аптеки. Хорошъ отъ нарывовъ.

23. ХОЛОДНЫЯ ПРИМОЧКИ. Изъ свѣжей холодной воды и почаще перемѣнять; при ушибахъ хорошо прибавлять немного уксусу, или простаго вина. Если голова очень горяча, лихорадка сильна и съ бредомъ, то прикладывать къ головѣ мелко разбитаго льду или снѣгу въ свиномъ пузырьѣ.

24. СВИНЦОВУЮ ВОДУ всего лучше употреблять, какъ холодную примочку, при ушибахъ и ранахъ. Она готовится изъ 60 капель свинцовой вытяжки (*extractum saturni*), или 1 чайной ложки свинцоваго сахара (*sacharum saturni*) на стаканъ воды, съ прибавленіемъ 2—3 столовыхъ ложекъ простаго вина.

25. ТЕПЛЫЯ ПРИПАРКИ готовятся изъ крупъ, вареныхъ въ водѣ, или молокѣ— всего лучше изъ льнянаго сѣмени, или овсяныхъ крупъ. Онѣ

варятся не очень густо, выкладываются въ подержанный полотняный платокъ и прикладываются до такой степени теплыми, какъ только больной можетъ выдержать ихъ безъ боли. Когда остынутъ, то надо переменить. А какъ ночью трудно бываетъ это сдѣлать, то вечеромъ лучше снять ихъ и приложить къ больному мѣсту вытяжнаго пластыря.

Это превосходное средство въ особенности употребляется при воспаленіи съ сильною болью и напряженностью, для того чтобъ разрѣлъ нарывъ; а когда прорвется, то чтобъ свободнѣе вытекала гной.

26. ИЗВѢСТКОВАЯ ВОДА. Изъ 1 столовой ложки жженой извести на 1 стаканъ воды; дать постоять часъ, по временамъ помѣшивая; потомъ процѣдить сквозь полотно. Она служитъ высушивающимъ средствомъ и употребляется допояма съ деревяннымъ масломъ, или одна, противъ обжоги, поверхностныхъ нарывовъ и кровотеченія.

27. ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ (клизтиры): 2 ложки деревяннаго масла, 8 золотниковъ мыла и 2 стакана ромашки. Если хотять чтобъ промывательное скорѣе дѣйствовало, то прибавить 1 столовую ложку соли или вмѣсто деревяннаго масла вѣды клещевиннаго.

Промывательное должно быть такъ не горячо, чтобы можно было безъ боли держать на трубкѣ

наружную сторону ручной кисти. Конец трубки намазать деревянным масломъ. Больной долженъ принять промывательное, лежа на правомъ боку и держать его въ себѣ какъ можно долѣе.

28. **БАНЯ** есть самое обыкновенное и лучшее народное средство отъ простуды, особливо тотчасъ послѣ простуды. Но если уже открылась лихорадка, заболѣла голова и сдѣлался сильный кашель съ закладываніемъ груди, то должно остерегаться бани; тогда лучшимъ средствомъ служить слѣдующее:

29. **ВАННА**. Ее дѣлаютъ изъ теплой воды—такой теплоты, какую больной выдержать можетъ—около 30 градусовъ по Реомюру. Можно также положить въ ванну немного сѣна. Когда вода начнетъ остывать, подливаютъ по немного теплой. Больной сидитъ въ ваннѣ сколько можетъ, не смотря время: впрочемъ до тѣхъ только поръ, когда чувствуетъ большое расслабленіе. Хорошенько обтереться полотенцомъ, лечь въ постель, потеплѣе одѣться и выпить стаканъ или два чаю.

Въ деревняхъ рѣдко можно найти ванну. Въ-место ея взять большую бочку, выбивъ изъ нея одно дно.

30. **ПОЖНАЯ ВАННА**. На ведро горячей воды пригоршни золы и немного сухой горчицы, или соли. Держать ноги въ ваннѣ по крайней мѣрѣ

часть, и весьма осторожно лечь въ постель, чтобъ не простудиться.

Это очень хорошее средство отъ головной боли съ приливомъ крови къ головѣ и при недостаточномъ мѣсячномъ очищеніи съ болью. Въ послѣднемъ случаѣ употреблять эту ванну нѣсколько вечеровъ сряду, передъ тѣмъ, какъ ждуть кровей.

54. КРОВОПУСКАНИЕ. Кровь пускають въ деревняхъ цирюльники и нерѣдко очень дурно. Объ употребленіи этого средства см. (II—передъ 23). Передъ кровопусканіемъ всегда должно очищать инструментъ горячею водою въ избѣжаніе возможнаго зараженія, потому что ланцетъ иногда употребляется и для вскрытія венерическихъ нарывовъ. Перевязку послѣ кровопусканія дѣлать покрѣпче, однако-же такъ, чтобъ рука не опухла и не посинѣла. Перевязку и повязку (шарфъ) на руку носить вообще сутки. Послѣ кровопусканія можнo и спать; только смотрѣть, чтобъ не разошлась перевязка.

Очень часто послѣ кровопусканія бываетъ изъ красна-синевадая опухоль, которая иногда дѣлается твердою и съ болью; или ранка не скоро заживаетъ, но гноится и болитъ. И то и другое не опасно и проходитъ, когда нѣсколько дней будутъ прикладывать корпію, намоченную въ свинцовой водѣ.

52. КРОВОПУСКАНИЕ ИЗЪ НОГИ. Кровь изъ ноги пускаютъ женщинамъ, когда, отъ полнокровія, мало бываетъ кровей, или когда онѣ идутъ съ болью.

Если, при кровопусканіи, идетъ кровь медленно и въ маломъ количествѣ, то поставить ноги въ теплую воду (ножную ванну).

53. ШЯВКИ. Употребляются медицинскія, которыя узнаются по 6. полоскамъ на спинѣ. Сохраняются въ чистой водѣ, которая переменяется лѣтомъ 3, а зимою 4 разъ въ недѣлю. На дно сосуда насыпаютъ немного песку и толченаго древеснаго угля, складутъ также нѣсколько штукъ при го корня (*salvus aromaticus*), если онъ есть. Банку завязываютъ полотняною тряпкою и держатъ въ свѣтломъ мѣстѣ, гдѣ воздухъ чистъ и не жаръ и гдѣ вода не вся замерзаетъ. Дымъ и запахъ табака для шявокъ очень вреденъ.

Если привозятъ ихъ изъ города, то надо только сполоснуть внутри (всполоснуть) банку водою потому что если въ ней будетъ много воды, то шявки станутъ сильно трястись при перевозкѣ и не примутся. После употребленія можно ихъ высушить и сохранять; но только чрезъ полгода гниютъ онѣ опять годными къ употребленію.

Припускаютъ шявокъ изъ рюмки, которую держатъ какъ можно ближе къ больному мѣсту. Если

одна или нѣсколько пѣвокъ пьютъ слишкомъ долго, то посыпаютъ ихъ солью, послѣ чего онѣ отпадаютъ; потомъ уже не годятся къ употребленію. Если же вовсе не принимаются, то ихъ пускаютъ въ пиво и снова припускаютъ.

Когда пѣвки отпадаютъ, кровотечение поддерживается теплою водою; но это дѣлается только послѣ припусканія пѣвокъ къ головѣ. На другихъ же частяхъ тѣла всего лучше, въ избѣжаніе простуды, прикладывать къ ранкамъ теплыя припарки, перемѣняя ихъ раза 2—3 въ часъ, и кровь очень хорошо вытекаетъ подъ ними.

Для унятія крови прикладываютъ къ ранкамъ трутль изъ жженныхъ холетинныхъ тряпокъ.

54. УГОЛЬНЫЙ ПОРОШЕКЪ, мелко истолченный, всего лучше изъ липоваго дерева. Долженъ быть какъ можно свѣжѣе.

Прекрасное средство противъ зловоннаго жаривовъ и отъ антонова огня.

55. КОМПРЕССОМЪ называется дощукъ полотна, сложенный вчетверо или болѣе. Такъ называемый градусный компрессъ употребляютъ тогда, когда хотятъ произвести давленіе на маленькомъ пространствѣ. На это пространство кладутъ маленькій компрессъ; сверхъ него другой нѣсколько побольше и напоследокъ 3 или 4 еще побольше такъ, что-всѣ они вмѣстѣ составляютъ пирамиду

обращенную вершиной книзу. Эти компрессы перевязываются бинтомъ.

36. БИНТЬ дѣлають изъ холста, не слишкомъ тонкаго, различной ширины, смотря по употребленію. Края не должны быть обрублены. Бинть дѣлають также изъ фланели противъ ревматизма (ломоты), или водяной.


IV. ДІЭТА.

Классу людей, для котораго предназначается эта книга, особливо крестьянамъ, трудно и почти невозможно съ точностію исполнять правильныя діэтическія наставленія. Дворовые люди, напротивъ, находятся подъ присмотромъ, и въ тѣхъ случаяхъ пользуются лучшимъ уходомъ.

Главное правило состоитъ въ томъ, что при отсутствіи аппетита, то и желудокъ не переноситъ пищи. Большая часть людей низшаго класса думаютъ, что отсутствіе аппетита есть причина болѣзни, хотя это бываетъ совершенно наоборотъ, и принуждаютъ себя есть, отчасти по сему поводу вина. Неправильность такого мнѣнія должно стараться объяснить больнымъ и здоровымъ людямъ.

И такъ, въ трудныхъ лихорадочныхъ случаяхъ, когда вовсе нѣтъ аппетита, не давать больнымъ ничего есть; но пить сколько хотять, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше.

Но если они просятъ есть по привычкѣ пищу, то давать имъ 2 раза въ день чаю съ сухимъ хлѣбомъ.



Всякое кислое питье должно готовить изъ отварной воды. Не давать его при сильномъ кашлѣ, при поносѣ и выpusканіи урины съ болью.

Миндальное молоко готовится изъ 10 золотниковъ сладкаго толченаго миндаля, разведеннаго 2 стаканами холодной воды, съ сахаромъ по вкусу. Питье это можно всегда давать больному, и оно въ особенности хорошо при кашлѣ, или при выpusканіи урины съ болью; но скоро надобѣдетъ.

Жидкій отваръ изъ овсяныхъ или ячменныхъ крупъ хорошъ во всякомъ случаѣ. Равно и простой, или грудной чай.

Больнымъ, по большой части, чего нибудь особенно хотѣтъ.

Черствый (ржаной) хлѣбъ можно давать при діетѣ, когда больной не можетъ есть бѣлаго (пшеничнаго) хлѣба, или когда его нѣтъ. Онъ долженъ быть хорошо выпеченъ, и не долженъ быть слишкомъ торокъ.

Квасу больные всегда просятъ. Какъ питье въ лихорадкѣ, онъ собственно не годится, но больно можно давать раза два въ день по полустакану, онъ безъ того не можетъ употреблять ничего другаго; только квасъ долженъ быть легкимъ жидокъ и хорошенько перебродить. Слѣдуетъ знать, что онъ вреденъ для больныхъ, и не слѣдуетъ давать.


Соленые огурцы. Одинъ огурецъ можно варить въ супѣ при діетѣ № 2-й. Впрочемъ, давать только по небольшому куску по окончаніи самой діеты № 2-й для возбужденія аппетита, и притомъ безъ кожи.


Капусты можно давать въ отварѣ (во щахъ) при діетѣ № 2-й, также и свеклы (въ борщѣ); но самой капусты и свеклы не есть.


Селедка очень удобоварима и ея можно давать по небольшому куску; также икры.

Запрещаются во всякой болѣзни грибы, постное масло, жирная соленая рыба, лукъ, молоко, пироги, яича въ крутую, простое вино и проч.

Примѣчаніе. Эти общія діететическія правила допускаютъ однако же нѣкоторое измѣненіе, когда, смотря по болѣзни, нѣкоторое средство позволяется, или запрещается. Такъ, на примѣръ, простое вино вообще въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ случаяхъ тогда должно допустить.







III

Дѣтскія болѣзни.

	Стран.
37. Желтуха.....	55.
38. Обопрьтость.....	56.
39. Молочница.....	—
40. Глазная болѣзнь у новорожденныхъ.....	—
41. Венерическая болѣзнь.....	57.
а) Незалуца.....	—
б) Опухоль яиць.....	—
42. Поносъ.....	58.
43. Рвота.....	59.
44. Лихорадка.....	—
45. Пупочная грыжа.....	—
46. Прорѣзываніе зубовъ.....	60.
47. Золотуха.....	61.
Золотушное воспаленіе глазъ, бельмо.....	62.
48. Англійская болѣзнь.....	63.
49. Парши.....	—
50. Дѣтская сухотка.....	64.
51. Скарлатина.....	—
53. Корь.....	66.
Разныя сыпи, сопровождаемыя лихорадкою..	67.
Коклюшъ.....	—
Г.....	—

Наружныя болѣзни.

Воспаленіе.

55. Наружн. воспаленіе.....	68.
56. Пагноеніе.....	—
57. Аптоновъ огонь.....	—
58. Ракъ.....	—
59. Воспаленіе пальцевъ.....	—
60. Воспаленіе железъ.....	—
61. Воспаленіе глазъ.....	—
62. Рожа.....	—
Рожа на лицѣ.....	—
63. Вередъ (чирей).....	—
64. Сожога.....	—
65. Замерзаніе.....	—

Болезни отъ наружнаго насилія.

	Стран
66. Ушибъ.....	76
а) Ушибъ головы.....	77
б) Ушибъ груди и живота.....	—
в) ——— колѣна.....	—
г) ——— яиць.....	78
67. Раны.....	—
а) Удаленіе постороннихъ тѣлъ.....	—
б) Кровотеченіе.....	—
аа) Кровотеченіе изъ жилъ.....	79
бб) Кровотеченіе изъ пульсовой жилы.....	—
в) Первая перевязка.....	80
г) Снятіе первой перевязки.....	—
д) Дальнѣйшее леченіе.....	81
е) Дикое мясо.....	—
ж) Внутреннее леченіе.....	—
68. Укушеніе бѣшеною собакою.....	—
69. Ужаленіе пчелою или осою.....	82
70. Переломъ костей.....	—
Общія правила 1.....	—
а) Переломъ ключицы.....	—
б) ——— верхней части руки.....	—
в) ——— нижней части руки.....	—
г) ——— ребръ.....	—
д) ——— бедренной кости.....	—
е) ——— берцовою к.....	—
71. Вывихъ.....	—
72. Грыжа, кила.....	—
а) Внезапная (падающая).....	91
б) Застарѣлая грыжа.....	92
Выпаденіе проходной кишки.....	—
Внезапная боль въ поясницѣ.....	93

Язвы.

Язвы.....	94
Язвы.....	—
Язвы.....	95

Постороннія тѣла.

	Стран.
79. Занозы.....	96.
80. Постороннія тѣла въ зѣвъ (глоткѣ).....	—
81. — — въ желудкѣ.....	—
82. — — въ глазу.....	97.
83. Мѣшечная опухоль.....	—
84. Плосцицы.....	—

Отравы и внезапныя опасности жизни.

Общее примѣчаніе 1—4.....	98.
85. Мышьякъ.....	99.
86. Сулема.....	—
87. Венеціанская ярь.....	—
88. Ланисъ.....	100.
89. Кислоты.....	—
90. Опій.....	—
91. Бѣлена.....	—
2. Грибы.....	101.
Шпанскія.....	—
Соленая рыба.....	—
95. Утопленіи.....	102.
96. Явленіи.....	103.
97. Угарь.....	104.
98. Убіеніе омъ.....	—
Смерть.....	—

III. ЛЕКАРСТВА и МЕДИЦИНСКІЯ ПОСОБІЯ.


1. Напастырная микстура.....	1
2. Микстура изъ англійской или Глауберовой соли.....	—
3. Детская мазь.....	—
4. Селитренная микстура.....	—
5. Рвотное.....	—
6. Кремортартаръ.....	—
7. Сыворотка.....	—
8. Потогонный чай.....	—
9. Кровочистительный чай.....	—
10. Мочегонный чай.....	—

	Стран
11. Грудной чай.....	108.
12. Укропный чай.....	—
13. Масленная эмульсія.....	—
14. Ртутная или неаполитанская мазь (политанъ).....	109.
15. Шпанская муха.....	—
16. Фонтанели.....	—
17. Горчичники.....	110.
18. Дигестивная мазь.....	—
19. Базиликонная (базильная) мазь.....	—
20. Спускъ.....	111.
21. Лишій пластырь.....	—
22. Гуммозный или милотный (вытяжной) пластырь.....	—
23. Холодные примочки.....	—
24. Свинцовая вода.....	—
25. Теплыя припарки.....	—
26. Известковая вода.....	112.
27. Промывательныя (клизтицы).....	—
28. Баня.....	11
29. Ванна.....	—
30. Ножная ванна.....	—
31. Кровопусканіе.....	—
32. Кровопусканіе изъ ноги.....	—
33. Шлявки.....	—
34. Угольный порошокъ.....	116.
35. Компрессъ.....	—
36. Бянтъ.....	117.

IV. ДІЭТА.

Общее примѣчаніе.....	118.
Діета № 1-й.....	119.
Діета № 2-й.....	—
Питье.....	120.
Позывъ на особенную пищу.....	121.
Исключаемая пища.....	122.
ДОМАШНЯЯ АПТЕКА.....	123.





2 p 48

